

Склад

1 мл препарату містить: метиленового синього 0,01 г (10 мг); *допоміжні речовини*: етанол 40 %.

Властивості

Метиленовий синій належить до антисептичних засобів-барвників. В основі механізму антисептичної дії метиленового синього лежить його здатність реагувати з певними кислотними або основними групами речовин граммпозитивних бактеріальних клітин, із мукополісахаридами і білками з утворенням малорозчинних і повільно іонізуючих комплексів.

Рекомендації щодо застосування

Розчин метиленового синього рекомендовано застосовувати при опіках, піодермії, різних гнійно-запальних процесах шкіри.

Спосіб застосування

Застосовують місцево.

Дорослим та дітям від 1 року розчином змащують уражену ділянку шкіри, захоплюючи навколишні здорові тканини.

Тривалість застосування визначається індивідуально з урахуванням ефективності лікування.

Застереження

Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

З обережністю призначають в період вагітності та годування груддю.

Протипоказання

Підвищена чутливість до метилтіонінію хлориду.

Дитячий вік до 1 року.

Форма випуску

Розчин темно-синього кольору по 20 мл у флаконі.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці, при температурі 15 - 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.