

Состав

Действующее вещество: гексетидин.

Вспомогательные вещества: сахарин, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло цветов апельсина, эфирное масло перечной мяты, левоментол, метилсалицилат, глицерин 85%, спирт этиловый

Показания

Для профилактики воспалительных заболеваний ротовой полости и горла, вызванных бактериальными, грибковыми инфекциями:

- при инфекционных и воспалительных заболеваниях полости рта и горла (тонзиллит, фарингит, стоматит, пародонтит, кровоточивость десен),
- при грибковых заболеваниях (кандидозе) ротовой полости и горла,
- травмы полости рта и горла,
- профилактика инфекций после удаления зуба

Противопоказания

- гиперчувствительность к любому компоненту средства;
- атрофический фарингит;
- бронхиальная астма или любые другие заболевания дыхательных путей, связанные с имеющейся гиперчувствительностью дыхательных путей;
- детям до 8 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными препаратами и других формах взаимодействий.

Особенности по применению

При применении средства не проглатывать и избегать контакта с глазами, поскольку оно содержит этанол.

С осторожностью применять пациентам со склонностью к аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

При появлении признаков гиперчувствительности к средству использования следует немедленно прекратить.

Не рекомендуется длительное применение, поскольку может измениться естественный микробный баланс полости рта и горла, где есть риск бактериального и грибкового распространения.

Если симптомы сохраняются дольше 5 дней и повышенная температура тела, необходимо обратиться к врачу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения изделия во время беременности и грудного вскармливания недостаточен, поэтому перед началом применения необходимо рассмотреть потенциальные риски и преимущества медицинского изделия и применять его только в случае крайней необходимости.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Средство содержит этанол. Водителям не рекомендуется управлять автомобилем в течение 30 минут после применения спрея.

Особенности применения в зависимости от возраста.

Не применять детям до 8 лет.

Способ применения

Применять в качестве местного средства для орошения полости рта и ротоглотки.

Взрослым и детям от 8 лет: 1 распыление 2 раза в день, утром и вечером после еды. При необходимости дозировка может быть увеличена максимум до 2 распылений 3 раза в день.

Курс лечения – не дольше 5 дней

Передозировка

Сообщений о передозировке средства не поступало.

Из-за всасывания достаточного количества раствора в полости рта может возникнуть алкогольная интоксикация из-за содержания этилового спирта.

Концентрация гексетидина в спрее не токсична, если препарат использовать по назначению.

Возникновение острой алкогольной интоксикации маловероятно. Если ребенок проглотил значительную дозу, может возникнуть алкогольная интоксикация из-за содержания этилового спирта.

Не отмечалось случаев чрезмерного применения гексетидина, что приводило к реакциям гиперчувствительности.

Лечение передозировки является симптоматическим, но редко необходимо. В случае проглатывания ребенком содержимого флакона следует немедленно обратиться к врачу. Необходимо рассмотреть возможность проведения промывания желудка в течение 2 часов после глотания и принять меры по устранению признаков алкогольной интоксикации.

Побочные эффекты

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, ларингоспазм, бронхоспазм, язвы и кровоточивость в месте применения.

Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение обоняния и вкусовых ощущений (ощущение сладкого может изменяться на чувство горького).

Со стороны пищеварительной системы: ощущение жжения слизистой ротовой полости.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл во флаконе с пульверизатором.

Срок годности

2 года.

Производитель

Название и местонахождение производителя. "FLUMED-PHARM"
LLC address: Republic of Moldova, MD-2002, Чисинау, Chetatya Albe
Street,no 176

"Флумед-Фарм" ООО Адрес: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Четя
Албе, 176

Уполномоченный представитель в Украине: ООО «АЛИНФАРМ»

Адрес: 40035, Украина, г. Сумы, пр. М. Лушпы, 51, кв. 3