

Состав

действующие вещества: кислота салициловая, масло касторовое, настойка плодов перца стручкового (*Capsici fructus*) мелко порезанных (1:10) (экстрагент - этанол 90%);

1 мл препарата содержит: салициловой кислоты 10 мг, масла рициновой 100 мг, настойки плодов перца стручкового (*Capsici fructus*) мелко порезанных (1 : 10) (экстрагент — этанол 90 %) 0,1 мл;

вспомогательное вещество: этанол 96%.

Лекарственная форма

Раствор накожный, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от красновато-желтого, желтого до желтоватого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические препараты. Код АТХ D11A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Капсиол® оказывает местное раздражающее, смягчающее и кератолитическое действие, что способствует улучшению питания кожи головы и росту волос. Салициловая кислота, входящая в состав лекарственного средства, оказывает антисептическое действие, что вместе с смягчающим эффектом касторового масла обеспечивает удаление перхоти. Настойка стручкового перца проникает в волосяные мешочки и раздражает луковицы волос, стимулируя его рост.

Фармакокинетика. Не изучалась.

Показания

Терапия и профилактика выпадения волос, удаление и предотвращение появления перхоти.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Местное применение препаратов, содержащих салициловую кислоту, не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными препаратами ретиноидов. Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств. Может усилить нежелательное действие метотрексата, гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов, производных сульфонилмочевины.

Противопоказания

Заболевание кожи различного характера, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особенности по применению

Не следует наносить лекарственное средство на места с острым воспалительным процессом кожи или ее повреждением.

Предотвращать попадание препарата в глаза. При попадании в глаза следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Применение препарата в период беременности противопоказано. В случае необходимости лечения Капсиолом кормление грудью следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Неизвестная.

Способ применения

Препарат втирать в кожу головы массирующими движениями до мытья волос. Оставить на коже головы на 1 час, после чего препарат нужно тщательно смыть. Применять Капсиол не чаще, чем 1 раз в неделю. Курс лечения составляет 1-2 месяца. Через 3-4 нед курс лечения необходимо повторить.

Использование однодозовых флаконов по 10 мл. Открутить крышку. Перевернуть флакон вверх дном и, осторожно встряхивая, сначала нанести раствор на участки кожи головы, где особенно заметно выпадение волос. Затем разделить волосы на пряди и наносить раствор прямо на кожу головы в каждом проборе.

После применения лекарственного средства Капсиол необходимо тщательно вымыть руки.

Дети. Не применять детям до 12 лет.

Передозировка

При применении больших доз может усиливаться кератолитическое действие и аллергические реакции. Терапия симптоматическая.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, сухость, шелушение, раздражение кожи, контактный дерматит, крапивница, зуд, требующий отмены препарата.

При длительном применении возможно всасывание препарата в системное кровообращение и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, тахипное.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Лекарственное средство нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 мл во флаконе с пробкой-капельницей, по 4, 8 или 12 флаконов в пачке; по 100 мл или по 200 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке; по 100 мл или по 200 мл во флаконе с пробкой-капельницей, по 1 флакону с пробкой-капельницей в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ» (ответственный за выпуск серии, не включая контроль/испытание серии).

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности.

08303, Киевская область, город Борисполь, ул. Млечная, дом 17.

Заявитель

ЧАО «ФИТОФОРМ».

Местонахождение заявителя.

Украина, 02092 город Киев, ул. Алматинская, дом 12.

Адрес

Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.