

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит масло мяты перечной (в пересчете на 50% ментол) 31 мг, камфоры рацемической 64 мг, настойки валерианы корней (*Valerianae radix*) (1: 5) (экстрагент - этанол 70%) до 1 мл ;

1 мл препарата содержит 46 капель.

Лекарственная форма

Капли.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желтовато-бурого до красновато-бурого цвета, ароматного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Препарат оказывает умеренное обезболивающее, антисептическое и освежающее действие, обусловленное фармакологическими свойствами веществ, входящих в его состав.

Показания

Симптоматическое лечение зубной боли различной этиологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эпилепсия, склонность к судорожным припадкам, бронхиальная астма, избегать контакта с поврежденной слизистой оболочкой.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Отсутствует информация о возможных взаимодействиях.

Особенности применения

В случае появления нежелательных аллергических реакций следует прекратить применение препарата и смыть его остатки с мест применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в состав препарата входит этанол, при применении следует воздерживаться от управления автотранспортом и потенциально опасных видов деятельности из-за возможных побочных реакций (головокружение, сонливость).

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, капли не рекомендуется применять женщинам в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Для успокоения зубной боли к больному зубу прикладывают ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата.

Капли не глотать!

Дети

Капли не рекомендуется применять детям до 12 лет.

Передозировка

Возможно развитие повышенной чувствительности к препарату, усиление побочных эффектов.

При случайном попадании внутрь возможны: тяжелые проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе, тошнота, рвота, диарея, ректальные язвы, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, потеря сознания, приливы, сонливость, затруднение дыхания, головная боль, возбуждение, нарушение деятельности сердца, снижение артериального давления.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы

Иногда могут возникать аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, крапивница, зуд, эритема, анафилактический шок.

Со стороны центральной нервной системы

Головная боль, головокружение, сонливость, атаксия, тремор, судороги, возбуждение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы

Брадикардия.

Со стороны дыхательной системы

Бронхоспазм.

Реакция в месте введения

Раздражение слизистой оболочки, чувство жжения.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).