

Состав

действующее вещество: бензокаин (benzocaine);

Дентол 7,5%, 1 г геля содержит 75 мг бензокаину;

вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленгликоль 75, полиэтиленгликоль 8, сахарин натрия, сорбиновая кислота, вода очищенная, краситель красный FD & C № 40 лаковый (E 129), ароматизатор вишневый (пропиленгликоль, вода очищенная, краситель красный №2 лаковый, натрия бензоат (E 211), этанол, ароматизатор искусственный).

Лекарственная форма

Гель для десен.

Основные физико-химические свойства: гель бледно-розового цвета с легким фруктовым ароматом, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местной анестезии.

Код АТХ N01B A05.

Фармакодинамика

Бензокаин - местный анестетик, снижает проницаемость мембран для ионов натрия и блокирует проводимость нервных импульсов.

Фармакокинетика

Бензокаин слабо абсорбируется, действие начинается через 1 минуту после применения и продолжается 15-20 минут. Адсорбированный препарат быстро гидролизуется холинэстеразы крови и печени, выводится почками.

Показания

Дентол 7,5%:

- для быстрого устранения боли у детей от 4 месяцев и старше при прорезывании зубов;

- как временный скорпомощной средство при зубной боли у детей младшего и старшего возраста;
- для обезболивания при лечении зубов, незначительных повреждениях слизистой оболочки рта, стоматите.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензокаину, к другим местным анестетикам; локальная инфекция и множественные повреждения слизистой оболочки полости рта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Ингибиторы холинэстеразы могут подавлять метаболизм бензокаина, повышая риск системной токсичности. Бензокаин может подавлять антибактериальную активность сульфаниламидов.

Особенности применения

Не следует превышать дозу, частоту и длительность приема препарата. Не рекомендуется применять препарат чаще 4 раз в сутки и дольше 7 дней подряд.

Если симптомы не исчезают в течение 7 дней или раздражение, боль, покраснение не исчезают или усугубляются, или появляются отек, сыпь, лихорадка, следует немедленно обратиться к врачу.

Имеются сообщения, что назначение продуктов, содержащих бензокаин, может вызвать метгемоглобинемию. Такие симптомы как цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, что потенциально угрожает жизни и требует безотлагательного медицинского вмешательства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на управление автотранспортом или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

С осторожностью применять в период беременности и кормления грудью с учетом соотношения польза-риск.

Способ применения и дозы

Вымыть руки, открыть крышечку, срезать кончик тубы и нанести небольшое количество геля на десны, где прорезываются зубы. При зубной боли нанести гель вокруг больного зуба и в его полость. Процедуру можно повторить 3-4 раза в сутки.

Препарат не следует применять дольше 7 дней подряд.

Дети

Не использовать детям до 4 месяцев.

Рекомендуется применять препарат для лечения детей в возрасте до 2-х лет под наблюдением врача или медицинского работника.

Передозировка

Передозировка при соблюдении всех рекомендаций маловероятно. В отдельных случаях возможны токсические воздействия на центральную нервную систему (нарушение зрения, судороги, шум в ушах, сонливость, ощущение жара или холода, возбуждение, спутанность сознания, головокружение, чувство онемения, тревожности, беспокойство) угнетение сердечно-сосудистой системы (потливость, артериальная гипотензия, бледность, аритмия, остановка сердца) развитие метгемоглобинемии.

Лечение. При передозировке препарата следует прополоскать рот теплым раствором соды и срочно обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возникновение побочных действий возможно из-за превышения рекомендованных доз, повышение скорости абсорбции, гиперчувствительности в т.ч. аллергический контактный дерматит (сыпь, покраснение, зуд, крапивница) ангионевротический отек (отек кожи или слизистой оболочки рта и горла) ощущение жжения, лихорадка. При появлении указанных симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При применении бензокаина очень редко возможна метгемоглобинемия (цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка, слабость, тахикардия).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 15 г в тубе, 1 туба в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек H4P 2T4, Канада.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).