

Склад

Aqua, Glycerin, Capsicum Annuum Extract, Spongilla (Spongilla lacustris) Extract, Symphytum Officinale Extract, Sodium diclofenac, Propylene Glycol, Carbomer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha arvensis (Mint) Oil, Tea Tree Leaf Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Tetrasodium EDTA.

Властивості

Диклофенак послаблює або усуває болі в місці нанесення, болі в суглобах у спокої і при русі, зменшує ранкову скутість і припухлість суглобів. Сприяє збільшенню обсягу рухів в уражених суглобах.

Екстракт бадягі має протизапальну та протинабрякову діями.

Екстракт живокосту лікарського (живокосту) допомагає при запаленнях і болях в суглобах, захворюваннях хребта, а також при різних порушеннях функцій опорно-рухового апарату.

Екстракт стручкового перцю містить капсаїцин, що володіє сильним подразнюють чутливі рецептори шкіри, ініціює місцевий прилив крові, підсилює обмінні процеси, підвищує тонус шкіри.

Основні діючі компоненти ефірної олії м'яти - *ментол і азулен*- забезпечують широкий спектр лікувальних ефектів. За рахунок наявності азулена масло м'яти має виражену протизапальну властивість. Ментол виявляє знеболювальну дію.

Масло чайного дерева - надає загальну релаксаційні і заспокійливу дію на уражене місце при суглобових і м'язових болях.

Рекомендації щодо застосування

- При посттравматичному запаленні м'яких тканин і опорно-рухового апарату (розтягнення зв'язок і м'язів, травматичні удари);
- при хворобливості м'язів і суглобів, пов'язаної з важкими навантаженнями;
- при ревматичних ураженнях м'яких тканин;
- при запальних і дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату (ревматоїдний артрит, гострий та хронічний подагричний артрит);
- при больовому синдромі і набряклості, пов'язані із захворюваннями м'язів і суглобів (ревматоїдний артрит, остеоартроз, радикуліт, люмбаго, ішіас).

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю нанести тонким шаром на шкіру і втирати до повного вбирання 2-3 рази на добу. Тривалість курсу не повинна перевищувати 2 тижні. Після нанесення гелю ретельно вимити руки. Необхідно уникати потрапляння гелю на відкриті рани, очі та інші слизові оболонки.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів. При появі алергічних реакцій необхідно припинити застосування і проконсультуватися з лікарем.