

## **Состав**

*действующее вещество:* ацикловир;

1 г крема содержит 50 мг ацикловира;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, спирт цетостеариловый, пропиленгликоль, масло минеральное, арлацел 165, полоксамер, натрия лаурилсульфат, диметикон, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

*Основные физико-химические свойства:* крем белого или почти белого цвета, однородной консистенции.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противовирусные средства.

Код АТХ D06B B03.

## **Фармакодинамика**

Агерп относится к противовирусным средств, которые являются высокоэффективными относительно герпесвирусов, особенно вирусов простого герпеса I и II типов, а также вируса опоясывающего герпеса. После попадания в клетку, пораженную вирусом герпеса, ацикловир превращается в активный трифосфат ацикловира. Его активность связана с нарушением синтеза ДНК герпесвирусов в клетке человека вследствие угнетения функции вирусной ДНК-полимеразы. Ацикловир не влияет на другие клеточные процессы, которые не связаны с синтезом вирусной ДНК.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетика препарата не изучалась, но учитывая литературные данные ацикловир в форме крема имеет очень низкий уровень системной абсорбции, даже при повторном применении.

## **Показания**

Инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к ацикловиру, другим компонентам препарата или валацикловира.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не обнаружено.

## **Особенности применения**

Следует избегать случайного попадания крема в глаза. При наличии открытых поражений губ следует иметь в виду, что вирус простого герпеса может передаваться другим лицам контактным путем. Крем Агерп следует применять только при герпетических поражениях слизистой оболочки губ и кожи лица. Не рекомендуется наносить препарат на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и половых органов. В случае особо выраженных проявлений заболевания необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно при наличии герпетических поражений у лиц с иммунодефицитными состояниями назначают системное лечение противовирусными средствами, поэтому в таких случаях не следует самостоятельно без консультации врача применять Агерп.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Исследования не проводились.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Агерп применяют беременным и кормящим грудью, если ожидаемая польза для пациентки превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Детям старше 12 лет и взрослым крем Агерп наносят на пораженные участки 5 раз в сутки с интервалом 4 часа, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно раньше после появления первых симптомов заболевания. Минимальная продолжительность лечения составляет 4 суток. Если за это время не произошло заживление, лечение продолжают до 10 дней. Если за 10 дней не наступило выздоровление, необходимо обратиться к врачу.

## **Дети**

Не рекомендуется применять Агерп детям до 12 лет из-за недостатка наблюдений.

## **Передозировка**

Литературные данные свидетельствуют об отсутствии любого токсического воздействия при случайном местном или пероральном приеме всей упаковки лекарственного средства.

## **Побочные реакции**

Препарат в целом хорошо переносится, но в некоторых случаях может появиться временный острый или жгучая боль в месте применения. Также редко могут наблюдаться незначительное высушивание и шелушение кожи, эритема и зуд. Очень редко возможно развитие контактного дерматита, а в отдельных случаях - ангионевротический отек после местного применения крема с ацикловиром.

## **Срок годности**

3 года.

Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 г в тубе, по 1 тубе в пачке из картона.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Совместное украинский-испанское предприятие «Сперко Украина».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

21027, Украина, г. Винница, ул. 600-летия, 25.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).