

Состав

действующее вещество: ацикловир;

1 г крема содержит 50 мг ацикловира;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, спирт цетостеариловый, пропиленгликоль, масло минеральное, арлацел 165, полоксамер, натрия лаурилсульфат, диметикон, вода очищенная.

Лекарственная форма

Основные физико-химические свойства: крем белого или почти белого цвета, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусные средства.

Код АТХ D06B B03.

Фармакодинамика

Агерп относится к противовирусным средств, которые являются высокоэффективными относительно герпесвирусов, особенно вирусов простого герпеса I и II типов, а также вируса опоясывающего герпеса. После попадания в клетку, пораженную вирусом герпеса, ацикловир превращается в активный трифосфат ацикловира. Его активность связана с нарушением синтеза ДНК герпесвирусов в клетке человека вследствие угнетения функции вирусной ДНК-полимеразы. Ацикловир не влияет на другие клеточные процессы, которые не связаны с синтезом вирусной ДНК.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучалась, но учитывая литературные данные ацикловир в форме крема имеет очень низкий уровень системной абсорбции, даже при повторном применении.

Показания

Инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (Herpes labialis).

Противопоказания

Гиперчувствительность к ацикловиру, другим компонентам препарата или валацикловира.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не обнаружено.

Особенности применения

Следует избегать случайного попадания крема в глаза. При наличии открытых поражений губ следует иметь в виду, что вирус простого герпеса может передаваться другим лицам контактным путем. Крем Агерп следует применять только при герпетических поражениях слизистой оболочки губ и кожи лица. Не рекомендуется наносить препарат на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и половых органов. В случае особо выраженных проявлений заболевания необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно при наличии герпетических поражений у лиц с иммунодефицитными состояниями назначают системное лечение противовирусными средствами, поэтому в таких случаях не следует самостоятельно без консультации врача применять Агерп.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Исследования не проводились.

Применение в период беременности или кормления грудью

Агерп применяют беременным и кормящим грудью, если ожидаемая польза для пациентки превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Детям старше 12 лет и взрослым крем Агерп наносят на пораженные участки 5 раз в сутки с интервалом 4 часа, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно раньше после появления первых симптомов заболевания. Минимальная продолжительность лечения составляет 4 суток. Если за это время не произошло заживление, лечение продолжают до 10 дней. Если за 10 дней не наступило выздоровление, необходимо обратиться к врачу.

Дети

Не рекомендуется применять Агерп детям до 12 лет из-за недостатка наблюдений.

Передозировка

Литературные данные свидетельствуют об отсутствии любого токсического воздействия при случайном местном или пероральном приеме всей упаковки лекарственного средства.

Побочные реакции

Препарат в целом хорошо переносится, но в некоторых случаях может появиться временный острый или жгучая боль в месте применения. Также редко могут наблюдаться незначительное высушивание и шелушение кожи, эритема и зуд. Очень редко возможно развитие контактного дерматита, а в отдельных случаях - ангионевротический отек после местного применения крема с ацикловиром.

Срок годности

3 года.

Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 г в тубе, по 1 тубе в пенале, по 1 пеналу пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Совместное украинский-испанское предприятие «Сперко Украина».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

21027, Украина, г. Винница, ул. 600-летия, 25.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).