

Состав

действующее вещество: настойка боярышника плодов;

1 мл препарата содержит настойку боярышника плодов (*Crataegi fructus*) (1:10) (экстрагент – этанол 70%).

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желто-красного до красновато-бурого цвета, горьковатая по вкусу, со слабым ароматным запахом; допускается образование осадка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в кардиологии. Код АТХ C01E B04.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в боярышнике плодах (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам. сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 мин – 1 час.

Показания

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии); как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонент препарата. Выражена артериальная гипотензия и брадикардия.

Особые меры безопасности

Препарат не рекомендуется принимать во время еды во избежание взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат усиливает действие сердечных гликозидов и антиаритмических средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется из-за возможности образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом. Может усиливать действие снотворных, седативных и гипотензивных средств.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат может привести к сонливости, поэтому во время применения следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды. Взрослым рекомендуется применять по 20 капель настойки 3 раза в сутки, детям от 12 лет – из расчета одна капля на 1 год жизни 3 раза в сутки до достижения стабильного лечебного эффекта.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка

Симптомы: снижение АД, сонливость, брадикардия.

Лечение: прекращение применения препарата и проведение симптоматической терапии.

Побочные реакции

Редко наблюдаются сонливость, значительное замедление сердечного ритма, аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе;

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, б. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).