

Состав

действующие вещества: ментол (левоментол), анисовое масло, настойка перца;

5 мл раствора содержат: ментола (левоментола) 1,0 мг анисового масла 0,0035 мл настойки перца 0,025 мл;

вспомогательные вещества: масло имбиря, масло гвоздичное, масло мяты перечной, глицерин, глюкозы раствор, сахароза, трагакант, бензойная кислота (Е 210), карамель (Е 150), настойка бензоина, толуанский бальзам, этанол 90%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для приема внутрь.

Основные физико-химические свойства: сироп темно-коричневого цвета с запахом этанола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, применяется при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат проявляет муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогонное действие.

Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи. Анисовое масло имеет отхаркивающие свойства, спазмолитическое и антибактериальное действие. Настойка перца оказывает отвлекающий эффект.

Показания

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и воспалением слизистых оболочек.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые меры безопасности.

С осторожностью применять больным сахарным диабетом, так как препарат в своем составе содержит сахарозу, глюкозу. Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие не описано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не оказывает снотворного эффекта, не влияет на способность управлять автотранспортом или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.

Способ применения и дозы

Применять внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 часа.

Детям 6-12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 часа.

Детям в возрасте 3-6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2:00.

Перед применением бутылочку встряхнуть.

Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.

Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.

Дети

Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные расстройства, реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 100 мл в бутылке, по 1 бутылке в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Белл Санз & Компани (Драггистс) Лимитед.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Гиффорд Хаус, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, PR9 9AL, Великобритания.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).