

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит боярышника плодов экстракт густой (*Crataegiae fructus extractum spissum*) (3,0-3,3: 1), (экстрагент: этанол 70% об / об), в пересчете на сухое вещество - 43 мг, пустырника экстракт густой (*Leonuriae herba extractum spissum*) (4,5-5,6: 1), (экстрагент: этанол 70% об / об), в пересчете на сухое вещество - 87 мг, таурин, в пересчете на 100% сухое вещество - 867 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: овальные таблетки от светло-серого или светло-бурого до темно-бурого цвета, с вкраплениями, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиологические средства. Код АТХ C01E X.

Фармакодинамика

Кратал оказывает мягкое кардиотоническое, антиангинальное, антиоксидантное, антиаритмическое, антигипоксическое, антиагрегантное и антиатерогенным действие; ингибирует ренин-ангиотензиновую и калликреин-кининовой системы, процессы перекисного окисления липидов, положительно влияет на выработку циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Улучшает кровоснабжение и функциональное состояние миокарда, увеличивает «коронарный резерв», улучшает сократительную и насосную функции сердечной мышцы, уменьшает артериальное давление и нормализует частоту сердечных сокращений.

Кратал уменьшает проявления дигиталисной интоксикации. Повышает работоспособность, улучшает настроение, оказывает успокаивающее, нейротропное действие (устраняет соматонегативные нарушения - раздражительность, изменения настроения).

Фармакокинетика

Компоненты препарата практически полностью всасываются из пищеварительного тракта. Время, за которое достигается максимальная концентрация таурина и других компонентов препарата в крови, составляет 2 часа. Кратал равномерно распределяется в тканях и жидкостях организма. Основное количество его выводится с мочой, период полувыведения - 6-8 часов.

Показания

- Нейроциркуляторная дистония;
- В составе комбинированной терапии при:
 - хронической ишемической болезни сердца;
 - пострадиационном синдроме.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата
- Выражены брадикардия и артериальная гипотензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Потенцирует антиангинальные эффекты нитратов, β -адреноблокаторов, антагонистов кальция, антигипоксанта, нейропротекторов, сердечных гликозидов. Уменьшает проявления дигиталисной интоксикации. Не следует применять препарат вместе с антиаритмическими средствами III класса, цизапридом.

Особенности применения

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Если во время лечения симптомы не исчезают или усиливаются, следует проконсультироваться с врачом.

Если появляется отек лодыжек или ног, возникает боль в области сердца, который может распространяться в левую руку, верхнюю часть живота или в область шеи, или при появлении одышки, необходимо немедленно консультация врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

На период лечения пациентам, которые принимают Кратал, следует воздерживаться от управления транспортными средствами и потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

До сих пор нет данных о применении препарата в период беременности и кормления грудью.

Препарат противопоказан для применения в период беременности.

При необходимости применения препарата в период кормления грудью, на период лечения кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Продолжительность лечения и дозу определяют индивидуально. Препарат применять внутрь, по 1-2 таблетки 3 раза в сутки перед едой. Курс лечения составляет 3-4 недели.

Дети

Опыта применения препарата у детей нет.

Передозировка

Симптомы: реакции гиперчувствительности, аллергические реакции, диспептические реакции, общая слабость, чувство усталости, головокружение, сонливость, артериальная гипотензия, брадикардия.

Лечение: отмена препарата и проведение симптоматической терапии.

Побочные реакции

Возможны проявления повышенной чувствительности, аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница), диспептические явления, общая слабость, повышенная утомляемость, головокружение, сонливость, артериальная гипотензия, брадикардия.

В случае появления любых нежелательных явлений больному необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр»
Борщаговский химико-фармацевтический завод ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 03134, г.. Киев, ул. Мира, 17.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).