

Состав

действующее вещество: экстракт подорожника жидкий (*Plantaginis lanceolatae folium*);

100 г сиропа содержат экстракта подорожника жидкого (*Plantaginis lanceolatae folium*) (1: 1) 5 г, экстрагент: этанол 20% (м. / М.);

5 мл сиропа содержат экстракта подорожника жидкого (1: 1) 0,32 г);

вспомогательные вещества: сироп сахарной свеклы, мед, калия сорбат, масло мяты перечной, сироп сахара инвертного, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: вязкая жидкость темно-коричневого цвета с приятным запахом, сладкая на вкус.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Основными действующими веществами подорожника ланцетолистного есть слизь, иридоидные гликозиды (аукубин, катапол), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая кислота) и их гликозиды (вербаскозид), сапонины, флавоноиды, танины. Благодаря этим веществам подорожник ланцетолистный обладает противовоспалительными, секретолитическими и антибактериальными свойствами. Разжижает мокроту, способствует отхаркиванию.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания

Симптоматическое лечение кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к подорожнику ланцетолистному (*Plantago lanceolata*) или к растениям семейства подорожниковых (*Plantaginaceae*) или к любому из вспомогательных веществ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты.

Особенности применения

Если во время применения данного лекарственного средства появляется одышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит 1,62 об. % Этанолa, то есть 190 мг / дозу (15 мл), что эквивалентно 4,8 мл пива, 2 мл вина в дозе. Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат. Препарат содержит 2,8 г глюкозы, 2,7 г фруктозы и 4,3 г сахарозы на дозу (15 мл). С осторожностью применяют больным сахарным диабетом. Препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахараз-изомальтазы.

Может быть вредным для зубов.

С осторожностью применять препарат больным, страдающим на гиперацидный гастрит, язвенную болезнь желудка с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагит.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Исследования о влиянии на способность управлять автотранспортом или другими механизмами не проводились.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Из-за отсутствия достаточных данных это лекарственное средство не следует принимать в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Принимать препарат каждые 2-3 часа с одинаковыми интервалами между приемами (5-7 раз в сутки): детям от 2 до 6 лет - по ½ чайной ложки (2,5 мл), детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл), взрослым и детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке (15 мл).

Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом, в среднем составляет 5-7 дней. Если в течение срока лечения состояние больного не улучшается, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Не применять детям до 2 лет.

Передозировка

О случаях *передозировки* не сообщалось.

При передозировке, например при случайном применении содержания всего флакона, могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т. ч. Гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), изжога, диарея.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года. Срок годности после вскрытия флакона - 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл или по 100 мл, или по 250 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Михелинштрассе 10, 66424 Хомбург, Германия/ Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).