

Состав

действующее вещество: настойка плодов боярышника измельченных (Crataegi fructus) (1:10) (экстрагент - этанол 70%);

1 флакон содержит настойки плодов боярышника измельченных (Crataegi fructus) (1:10) (экстрагент - этанол 70%) 25 мл или 100 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от красновато-желтого до темно-красного цвета. Во время хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в кардиологии. Код АТХ C01E B04.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты) усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к определенному усилению сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 минут - 1 час.

Показания

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат усиливает действие сердечных гликозидов и антиаритмических средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом. Боярышника настойка может усиливать действие снотворных, седативных, гипотензивных средств.

Особенности применения

Препарат не рекомендуется применять во время еды, чтобы избежать взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденных длительным применением.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

На период лечения следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки 3 раза в сутки, детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза в день до достижения стабильного терапевтического эффекта. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Детям до 12 лет противопоказано применение препарата.

Передозировка

Симптомы: снижение артериального давления, сонливость, брадикардия.

Лечение: отмена препарата. ОСОБЫЕ.

Побочные реакции

Со стороны нервной системы: сонливость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: замедление сердечного ритма.

Со стороны иммунной системы: при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).