

Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит настойки плодов боярышника (*Crataegi fructus*) (1:10)((экстрагент – этанол 70 % (об/об)) 100 мл.

Лекарственная форма

Настойка для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета с оранжево-красноватым оттенком. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в кардиологии. Код АТХ C01E B04.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника, усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к некоторому усилению сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 минут – 1 час.

Показания

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (в том числе нейроциркуляторная дистония), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Настойка боярышника должна потенцировать действие сердечных гликозидов и антиаритмических средств. Применение с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом. Может усиливать действие снотворных, седативных, гипотензивных средств.

Особенности применения

Препарат не рекомендуется принимать во время приема пищи во избежание взаимодействия с ее компонентами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат содержит этиловый спирт и может привести к сонливости, поэтому в период применения препарата следует воздержаться от управления автотранспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки 3 раза в сутки, детям от 12 лет – из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза в сутки до достижения стабильного терапевтического эффекта.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально.

В случае отсутствия пробки-капельницы для применения лекарственного средства, закупоренного пробкой укупорочной, использовать стеклянную пипетку медицинскую, при этом доза применения не изменится

Дети

Детям до 12 лет применение препарата противопоказано.

Передозировка

Симптомы: снижение артериального давления, сонливость, брадикардия.

Лечение: прекращение приема препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Сонливость, значительное замедление сердечного ритма, аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

100 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).