

Состав

действующее вещество: боярышника плодов настойка (Tinctura crataegi fructus);

1 флакон (банка) содержит: боярышника плодов настойки (Tinctura crataegi fructus) (1:10) (экстрагент этанол 70 % (об/об)) 100 мл;

вспомогательные вещества: отсутствуют, кроме экстрагента.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтовато-красного цвета, сладковатого вкуса. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в кардиологии.

Код АТХ C01E B04.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины, тритерпеновые кислоты), усиливают кровообращение в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, повышают чувствительность миокарда к сердечным гликозидам и уменьшают его возбудимость, что приводит к определенному усилению сокращений сердечной мышцы.

Фармакокинетика

Лекарственное средство хорошо всасывается при приеме внутрь. Эффект наступает через 30 мин – 1 час.

Показания

Функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторные дистонии), а также как вспомогательное лекарственное средство при легких формах нарушений сердечного ритма (мерцательная

аритмия, пароксизмальная тахикардия).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов лекарственного средства.
Выраженная форма артериальной гипотензии, брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Боярышника настойка потенцирует действие антиаритмических средств. Лекарственное средство усиливает эффекты сердечных гликозидов, снотворных, седативных, гипотензивных средств. Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования негативных комплексов. Не следует применять лекарственное средство вместе с цизапридом. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Лекарственное средство не рекомендуется принимать во время еды, чтобы избежать взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство является обычным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт и может вызвать сонливость, поэтому в период применения лекарственного средства следует воздерживаться от управления автотранспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности или кормления грудью, поскольку в состав лекарственного средства входит этанол.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь до еды. Взрослым рекомендуется принимать по 20 капель настойки, детям с 12 лет – из расчета 1 капля на 1 год жизни 3 раза в сутки до достижения стабильного лечебного эффекта (нормализация артериального давления, уменьшение сердцебиения).

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Не применять детям в возрасте до 12 лет в связи с тем, что лекарственное средство содержит этанол.

Передозировка

При значительном превышении дозы возможно возникновение сонливости, брадикардии, снижения артериального давления, что требует прекращения приема лекарственного средства и проведения симптоматической терапии.

Побочные реакции

Редко наблюдаются сонливость, значительное снижение сердечного давления, аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, высыпания, зуд, отек кожи).

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Не следует применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

100 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).