

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит экстракт травы термопсиса ланцетного сухой (экстрагент - этанол 25%) 0,043 г, натрия гидрокарбонат 0,2 г

вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), аммония хлорид, крахмал картофельный, тальк.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки от светло-желтого, светло-бурого до желто-бурого цвета, допускается сероватый оттенок, с вкраплениями, с насечкой для деления.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Екстратерм® - комбинированный препарат, который обладает отхаркивающим, противокашлевым и противовоспалительным действиями.

Термопсис усиливает секрецию бронхиальных желез. Алкалоиды (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин), содержащиеся в термопсисе, оказывают возбуждающее действие на дыхательный центр.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствуя снижению вязкости мокроты.

Показания

Симптоматическое лечение кашля (особенно при затрудненном отхождении мокроты) при заболеваниях дыхательных путей, таких как: трахеит, бронхит, бронхопневмония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит; язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, кровохарканье. Возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими препаратами, которые подавляют кашель.

Особенности применения

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется применение большого количества теплой жидкости.

Это лекарственное средство содержит 3,8 ммоль / дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые применяют натрий-контролируемую диету.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности или кормления грудью противопоказано.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь по 1 таблетке 3-4 раза в сутки.

Перед применением таблетку желательно растворить в 1/4 стакана кипяченой воды с температурой около 40 ° С, помешивая, или запить таблетку таким же количеством воды. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и определяется врачом.

Дети

Не применять лекарственное средство детям до 12 лет.

Передозировка

Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги.

Лечение - промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, гастрит, рвота, диарея.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 12 таблеток в блистере, по 1 блистера без пачки или по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПрАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 02152, г.. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).