

Состав

15 мл сиропа содержит:

действующие вещества: экстракт жидкий сложный (1: 4,4) - 1,0 г, изготовлен из: листья подорожника ланцетного (*Plantaginis lanceolatae folio*), травы гринделии (*Grindeliae herba*), плодов шиповника (*Rosae fructus*) (3: 1: 1) (экстрагент - этанол 50% (об / об)) экстракта травы чабреца (*Thymi herbae extractum*) (1: 4) - 0,6 г (экстрагент - этанол 30% (об / об), глицерин, вода аммиачная 25%) сока из травы эхинацеи пурпурной (*Echinaceae purpureae herbae succus*) (1: 1) - 0,4 г, (экстрагент - этанол 96% (об/об), вода очищенная);

вспомогательные вещества: концентрат смородины черной, сахароза, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: прозрачная сироп красно-коричневого цвета, с запахом смородины и чабреца, допускается опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Иммуностимулирующее, противовоспалительное, отхаркивающее средство. Главное действие препарата - размягчения густого и вязкого секрета, который находится в дыхательных путях, возбуждение и активация отхаркивающего рефлекса (*Grindelia robusta* L., *Plantago lanceolata* L.). Для вышеуказанных компонентов препарата характерно противовоспалительное и антибактериальное действие. Экстракт из плодов шиповника применяется при мягких формах катара верхних дыхательных путей. Сок из травы эхинацеи пурпурной активизирует иммунные процессы.

Фармакокинетика

Не исследовались.

Показания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, к цветам семейства сложноцветных, губоцветных. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, включая рефлюкс-эзофагит, гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые заболевания печени или почек. Туберкулез, ревматизм, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), рассеянный склероз, другие аутоиммунные заболевания, хронические вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция/СПИД, новообразования, первичный иммунодефицит, иммуносупрессия, заболевания лейкоцитарной системы крови (лейкоз, агранулоцитоз). Тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчнокаменная болезнь.

Противопоказания

Применяют в комплексном лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита на фоне ослабления защитных функций организма; с целью профилактики при пониженном иммунитете.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Ехинасаль не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксическим действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты. Препарат содержит этанол, который может повышать абсорбцию и фармакологическое действие некоторых седативных препаратов и опосредованно, изменяя активность системы цитохрома Р450, влиять на элиминацию лекарственных средств, метаболизирующихся при участии ферментов этой системы. Этанол может вызвать дисульфирамоподобную реакцию при одновременном применении, например, с некоторыми антибактериальными средствами.

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты.

Особенности применения

Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Пациенты с редкими генетическими нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахараз-изомальтазы, не должны принимать препарат.

Лекарственное средство содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Препарат содержит спирт, поэтому существует риск для пациентов, больных алкоголизмом. Алкоголь не рекомендуется для приема женщинам в период беременности и кормления грудью, детям и пациентам с повышенным риском развития печеночной недостаточности или эпилепсии.

Если заболевание органов дыхания имеют частые рецидивы и долговременные симптомы, которые проявляются затрудненным дыханием, лихорадкой, наличием мокроты с примесью крови или гноя, необходимо обратиться к врачу. В случае усиления симптомов заболевания или повышение температуры тела во время лечения следует немедленно обратиться к врачу.

Пациенты со склонностью к аллергии должны проконсультироваться с врачом перед приемом препарата, поскольку существует риск возникновения аллергических реакций.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственное средство в рекомендуемой дозе не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. В случае возникновения при применении препарата головокружение, нарушение сна, необходимо избегать управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственный препарат противопоказан при беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приема пищи, взрослым и детям старше 12 лет.

Детям от 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке (15 мл) 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения - 10 дней.

С целью профилактики следует принимать половину лечебной дозы:

детям старше 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке 2 раза в день.

Профилактическое применение препарата должно длиться не более 20 дней.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Симптомы: повышенная возбудимость, нарушение сна, раздражение слизистой оболочки, желудочно-кишечные расстройства, усиление проявлений побочных реакций. Из-за содержания алкоголя возможна алкогольная интоксикация, особенно у детей.

Лечение. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, анафилактический шок.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: покраснение кожи, отек кожи, зуд, сыпь, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона.

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм с обструкцией, астма, одышка.

Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение сна.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Были отдельные сообщения о возможной связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узелковая эритема, имунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена-Ларсена с нарушением тубулярной функции почек).

При длительном применении (более 8 недель) может возникнуть лейкопения.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 90 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 125 г сиропа во флаконе из темного стекла в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Вроцлавское предприятие лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АО.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Ксенця Витольда 56, 50-203 Вроцлав, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).