

Состав

действующее вещество: жидкий экстракт корневищ с корнями элеутерококка колючего (*Eleuterococcus senticosus*) (1: 1) (экстрагент - этанол 40%);

1 флакон содержит жидкого экстракта корневищ с корнями элеутерококка колючего (*Eleuterococcus senticosus*) (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) 50 мл.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, со специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующее средство. Код АТХ А13А.

Фармакодинамика

В состав элеутерококка колючего корневищ с корнями входят элеутерозидов А, В, В1, С, Д, Е, F и G, производные кумарина, флавоноиды, эфирное масло, растительный воск, смолы, крахмал и другие компоненты. Благодаря присутствию элеутерозидов препарат повышает физическую и умственную работоспособность, остроту зрения, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, улучшает обмен веществ, оказывает незначительное стимулирующее гонадотропную и гипогликемическое действие.

Фармакокинетика

Не изучались.

Показания

Физическое и умственное переутомление, неврастении и психостении, функциональное истощение центральной нервной системы, которое сопровождается снижением работоспособности, раздражительностью и бессонницей. Вегетоневрозы, послеоперационный период; в сочетании с другими средствами - при острой и хронической лучевой болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипертермический синдром, артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, острые инфекционные заболевания, инфаркт миокарда, аритмии, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может усиливать действие средств, которые стимулируют центральную нервную систему, аналептиков, гипогликемических средств и подавлять действие седативных и снотворных препаратов.

Особенности применения

При приеме препарата во второй половине дня возможна бессонница.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат содержит этанол 40%, поэтому при применении препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат содержит этанол 40%, поэтому не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Перед применением взболтать. Препарат назначать внутрь за 30 минут до еды.

Взрослым принимать по 20-30 капель 1 раз в сутки, детям старше 12 лет назначать из расчета 1 капля на год жизни ребенка 1 раз в сутки, предварительно развести небольшим количеством воды, в первой половине дня (то есть до 15 часов). Курс лечения составляет 25-30 дней, при необходимости повторять через 1-2 недели.

Дети

Не рекомендуется применять препарат детям до 12 лет, поскольку он содержит этанол 40%.

Передозировка

Возможно повышение артериального давления, нарушение сна, нарушение ритма сердца, снижение работоспособности, повышенная возбудимость.

Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, однако у пациентов, имеющих гиперчувствительность, возможно развитие аллергических реакций (покраснение кожи, сыпь, зуд);

- *со стороны центральной нервной системы:* возбуждение, нарушение сна, раздражительность, тревожное состояние, снижение работоспособности;
- *со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, повышение артериального давления.

При длительном применении (более 2 месяцев) может привести спазм мышц, нарушения со стороны пищеварительного тракта.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл, в стеклянных или полимерных флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).