

Состав

действующее вещество: 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии культуры бактерий (содержит $3,3 \times 10^8$ E.coli, убитых и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола);

вспомогательные вещества: ланолин, парафин желтый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: однородная мазь, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ C05A X.

Фармакодинамика

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, обладает противовоспалительным эффектом, предупреждает реинфекции и суперинфекции.

Фармакокинетика

Вследствие сорбции или транскитоza компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и иницируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, вызывает защитную иммунную реакцию.

Показания

Местное лечение симптомов геморроя, экземы и трещин анальной области.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Во время лечения мазью Постеризан прочность презервативов на разрыв может снизиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом это может негативно повлиять на качество презерватива.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Для применения препарата в период беременности и кормления грудью противопоказаний нет.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.

Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втереть пальцем.

Для ввода мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в упаковке.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

Дети

Не применять детям.

Передозировка

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось. В случае случайного приема внутрь мази (например, детьми) возможны желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

Побочные реакции

В отдельных случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение.

Может вызвать контактный дерматит (например, через гиперчувствительность к фенолу).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей и защищенном от света месте.

Упаковка

По 25 г в тубе алюминиевой с аппликатором.

По 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).