

Состав

действующие вещества: 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии культуры бактерий (содержит $5,0 \times 10^8$ E.coli, убитых и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола), 2,50 мг гидрокортизона;
вспомогательные вещества: ланолин, парафин желтый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: однородная мазь, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТХ C05A A.

Фармакодинамика

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, обладает противовоспалительным эффектом, предупреждает реинфекции и суперинфекции.

Фармакокинетика

Вследствие сорбции или трансцитоза компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и инициируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, вызывает защитную иммунную реакцию.

Показания

Местное лечение симптомов геморроя, экземы и трещин анальной области.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.

Специфические состояния кожи (туберкулез, сифилис, гонорея) в зоне

применения, ветряная оспа, реакция на вакцинацию, грибковые заболевания, воспалительные заболевания кожи лица (пероральный дерматит, розацеа), другие бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции в месте применения, язвенные поражения и атрофические изменения в месте применения, опухоли аноректальной зоны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении мази Постеризан форте с другими препаратами, содержащими кортикостероиды (в форме таблеток, капель или инъекций), возможно усиление терапевтических и побочных эффектов кортикостероидов.

Особенности применения

Лечение продолжать до исчезновения симптомов, но не более 5-7 дней.

При применении любых ГКС следует помнить о возможности системной абсорбции.

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Во время лечения мазью Постеризан форте прочность презервативов на разрыв может уменьшиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом это может негативно повлиять на качество презерватива.

Содержит ланолин. Может вызвать местные реакции кожи (например, контактный дерматит).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Кортикостероиды проникают через плаценту. В настоящее время отсутствуют четкие сведения по развитию тератогенных эффектов у человека, подобные тем, что наблюдались в опытах на животных. При системном применении больших доз кортикостероидов сообщалось о влиянии на плод или новорожденного ребенка (задержка роста в матке, коры угнетение).

Несмотря на малое количество информации по применению кортикостероидов в виде мази в период беременности, учитывая их ограниченную системную абсорбцию возможно применение кортикостероидов слабой и умеренной

действия (класс 1 и класс 2), таких как гидрокортизон, в течение коротких периодов времени и на ограниченных участках кожи. Вышеупомянутые эффекты нельзя исключать при длительном применении или нанесении на большие участки кожи. Это можно делать только при наличии особых показаний.

Кормления грудью. Гидрокортизон можно применять женщинам, которые кормят грудью, только в условиях кратковременного лечения и нанесения на небольшие участки кожи. При долгосрочном лечении или нанесении на большие участки пораженной кожи следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.

Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втереть пальцем.

Для ввода мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в упаковке.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

Дети

Не применять детям.

Передозировка

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось. Передозировка вызывает угнетение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В случае случайного приема внутрь мази (например, детьми) возможны желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

Длительное применение в больших дозах усиливает резорбцию и повышает риск развития системных эффектов гидрокортизона, таких как нарушения менструального цикла, повышение артериального давления, замедление заживления ран, мышечная слабость, бессонница, повышение уровня сахара в крови.

В случае, если наблюдаются симптомы гиперкортицизма, лечение следует

прекратить.

Побочные реакции

В отдельных случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан форте могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение, депигментация, гипертрихоз, сухость кожи.

Может вызвать контактный дерматит (например, через гиперчувствительность к фенолу).

При длительном использовании препарата в высоких дозах возможны следующие дерматологические реакции: дерматит, экзема, замедление заживления ран и трещин, развитие вторичной инфекции, атрофия слизистой оболочки, атрофия кожи, коры угнетение, расширение капилляров (телеангиэктазия), появление растяжек на коже (растяжек) и стероидных угрей.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей и защищенном от света месте.

Упаковка

По 25 г в тубе алюминиевой с аппликатором.

По 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).