

Состав

действующие вещества: 1 капсула содержит травы пассифлоры сухой экстракт (*Passiflora incarnata* L., herba extractum, siccum) (5-7: 1) (экстрагент - этанол 60% (об / об)), что эквивалентно 200 мг нативного экстракта, и листьев и цветков боярышника сухой экстракт (*Crataegus species*, folium cum flore, extractum, siccum) (4-7: 1) (экстрагент - этанол 45% (об / об)), что эквивалентно 160 мг нативного экстракта;

вспомогательные вещества: лактоза, кремния диоксид коллоидный, магния оксид, магния стеарат;

желатиновая капсула: титана диоксид (E 171), железа оксид желтый (E172), железа оксид красный (E172), гипромеллоза.

Лекарственная форма

Капсулы твердые.

Основные физико-химические свойства: капсулы с крышечкой коричнево-красного цвета и корпусом светло-коричневого цвета, содержащие порошок коричневого цвета с вкраплениями или спрессованный порошок.

Фармакотерапевтическая группа

Другие седативные и снотворные лекарственные средства. Код АТХ N05C M.
Другие кардиологические средства. Код АТХ C01E B.

Фармакодинамика

Персен Кардио является лекарственным средством растительного происхождения с мягким седативным действием.

Препарат содержит сухие экстракты травы пассифлоры и листьев и цветков боярышника.

Препараты, содержащие траву пассифлоры, применяемые при временных умственных перегрузках, возбужденном состоянии и бессоннице.

Экстракт листьев и цветков боярышника повышает сердечную проводимость, улучшает коронарный кровоток и сосудистое кровообращение, предотвращает сердечной аритмии и умеренно снижает артериальное давление.

Эффективность комбинации этих растений базируется на их традиционном применении. Эффекты лекарственных растений взаимно дополняются.

Комбинация оказывает умеренную седативную и кардиотоническую активность.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

1. Временные легкие формы психического напряжения, беспокойство и возбудимость.
2. Функциональные нарушения со стороны сердца и системы кровообращения, связанные со стрессом (например, ощущение усиленного сердцебиения).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к пассифлоре, боярышнику или к вспомогательным веществам препарата. Выраженная форма артериальной гипотензии, брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследование взаимодействия препарата Персен Кардио с другими лекарственными средствами не проводились. Перед применением любого другого лекарственного средства пациенту следует проконсультироваться с врачом.

Поскольку нельзя полностью исключить взаимодействие с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (сердечные гликозиды, антиаритмические и антигипертензивные препараты, диуретики, блокаторы кальциевых каналов, бета-антагонисты, нитраты), не рекомендуется их одновременное применение.

Компоненты экстрактов пассифлоры и боярышника могут влиять на активность гликопротеина Р, поэтому не исключается потенциальное взаимодействие с его субстратами.

Не рекомендуется одновременное применение с терфенадином, поскольку возможно развитие аритмии.

Не рекомендуется одновременное применение с синтетическими седативными препаратами (бензодиазепинами) без консультации с врачом.

Не следует применять препарат вместе с цизапридом.

Особенности применения

Пациентам с кардиоваскулярными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Если во время лечения наблюдаются отеки на ногах, одышка, боль в области сердца, распространяется на руки, брюшную полость или на участки возле шеи,

и когда симптомы не меняются в течение 6 недель, следует принять соответствующие меры, поскольку вышеупомянутые симптомы могут свидетельствовать о тяжелой сердечной недостаточности.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с тяжелыми органическими заболеваниями пищеварительного тракта.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат содержит экстракт травы пассифлоры, поэтому пациентам следует воздерживаться от управления автотранспортом или другими механизмами в течение 2 часов после приема препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена, поэтому его не следует применять в эти периоды.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет.

Рекомендуемая доза - 1 капсула в сутки. При необходимости дозу можно повысить до 1 капсулы дважды в сутки. Максимальная суточная доза - 2 капсулы.

Капсулы следует принимать до еды (за 1 час), запивая их жидкостью.

Для достижения оптимального терапевтического эффекта препарат следует принимать не менее 6 недель. Если после 6 недель лечения состояние больного ухудшилось либо не улучшилось, следует обратиться к врачу.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому не рекомендуется применять его этой категории пациентов.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось. Возможны проявления гиперчувствительности, что требует десенсибилизирующей терапии. При

значительном превышении дозы возможно возникновение сонливости, брадикардии, снижение артериального давления, требует прекращения приема препарата и проведения симптоматической терапии.

Побочные реакции

Со стороны ЖКТ: очень редко - тошнота, рвота, боль в животе, спазмы.

Со стороны иммунной системы: очень редко - реакции гиперчувствительности (например, зуд, высыпания на коже, гиперемия и отек кожи).

Со стороны сосудистой системы: частота не может быть оценена - васкулит.

Со стороны сердца: частота не может быть оценена - тахикардия, брадикардия, желудочковая тахикардия.

Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 8 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лек Фармацевтическая компания д. д./Lek Pharmaceuticals d. d.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Веровшкова 57, Любляна 1526, Словения/Verovskova 57, Ljubljana 1526, Slovenia.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).