

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит антитела к мозкоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений C12, C30 и C50 - 3 мг;

*вспомогательные вещества:* лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другой плоской стороне нанесена надпись TENOTEN KID.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат проявляет успокаивающее, противотревожными (анксиолитическое) действие, не вызывая нежелательных гипногенных и миорелаксантного действия. Улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок. Имеет стрессопротекторное, ноотропное, антиамнестическое, противогипоксическое, нейропротекторное, антиастеническое, антидепрессивное действие.

В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого нарушения мозгового кровообращения оказывает нейропротекторное действие, ограничивает зону повреждения в центральной нервной системе (ЦНС), улучшает процессы обучения и памяти.

Ингибирует процессы перекисного окисления липидов.

Модифицирует функциональную активность белка S-100, который объединяет синаптические (информационные) и метаболические процессы в мозге.

Оказывает ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, повышает активность стресслимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности.

## **Показания**

Невротические и неврозоподобные расстройства, сопровождающиеся повышенной возбужденностью, раздражительностью, тревогой, нарушением поведения и внимания, вегетативными нарушениями.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 3 лет.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.

## **Особенности применения**

Препарат применяют в педиатрической практике. Применяют детям в возрасте от 3 лет. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В связи с наличием в препарате активирующего компонента последний прием следует осуществлять не позднее чем за 2 часа до сна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат применяют детям.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность применения препарата беременным и женщинам в период лактации не изучалась.

Препарат применяют детям.

## **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь. Не использовать вместе с пищей.

Дозировка и длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.

Разовая доза для детей от 3 лет - 1-2 таблетки. Таблетку держать во рту (не разжевывая но не глотая) до полного растворения.

В случае необходимости таблетку можно растворять в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.

Принимать по 1 таблетке 1-3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев. В случае необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев или повторить через 1-2 месяца.

В случае отсутствия устойчивого улучшения состояния в течение 3-4 недель от начала лечения следует обратиться к врачу.

## **Дети**

Препарат применяют детям в возрасте от 3 до 18 лет.

## **Передозировка**

При случайной передозировке возможны диспепсические проявления, обусловленные вспомогательными веществами, входящими в состав препарата.

## **Побочные реакции**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

## **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 20 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО Сантоника.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ул. Вейвер 134Б, м. Каунас, Каунасское м. Один., LT-46353, Литва.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).