

Состав

действующее вещество: passiflora incarnata;

1 таблетка содержит сухой экстракт пассифлоры 100 мг;

вспомогательные вещества: К-30, кросповидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, покрытие Seripilm LP 007, краситель «Красное вино»;

состав покрытия Seripilm LP 007: гидроксипропилметилцеллюлоза, целлюлоза микрокристаллическая, кислота стеариновая;

состав красителя «Красное вино»: калия алюминия силикат (Е 155), железа оксид красный (Е 172).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, красного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства. Код АТХ N05C M.

Фармакодинамика

Экстракт пассифлоры производится из лекарственного растения *Passiflora incarnata* (пассифлора инкарната), которая содержит 0,04% алкалоидов индольного ряда (гарман, гармин, гармол), некоторые флавоноиды (витексин, квертецин), а также кумарины, хиноны и др.

Компоненты экстракта тормозят проведение нервных импульсов в спинном и головном мозге, снижают возбудимость центральной нервной системы и оказывают седативное действие.

Препарат улучшает настроение при депрессивных состояниях, уменьшает тревожность и психическое напряжение, оказывает легкий снотворный эффект без симптома угнетенности при пробуждении. Имеет противосудорожные свойства.

Показания

Как успокаивающее средство больным с неврастеническими и депрессивными состояниями, при стрессах, тревожном состоянии, нервозности, нарушениях сна, в климактерическом и преклимактерическом периодах.

Препарат эффективен при вегетативных симптомах заболеваний нервной системы (нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь, церебральные сосудистые кризы, повышенная потливость, сердцебиение), а также при синдроме постинфекционной астении.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Период беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами, угнетающими центральную нервную систему, такими как барбитураты, транквилизаторы, усиливается седативный и снотворный эффект препарата.

Не рекомендуется одновременный прием с бензодиазепинами. Следует избегать одновременного применения с дисульфирамом.

Во время лечения Алора® не следует употреблять алкогольные напитки.

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам с тяжелыми органическими заболеваниями пищеварительного тракта.

Пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с минимальной дозы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Во время лечения следует воздержаться от управления транспортом и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Эффективность и безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлены.

Способ применения и дозы

Для взрослых и детей старше 12 лет: для достижения седативного эффекта следует принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки перед приемом пищи. При нарушениях сна - по 2-3 таблетки 1 раз в час до сна.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от показаний и клинической эффективности препарата. Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Дети

Препарат в данной лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Нет данных о передозировке препарата. Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Лечение: промывание желудка.

Побочные реакции

При применении в рекомендованных терапевтических дозах возникновение побочных эффектов маловероятно.

С неизвестной частотой на страстоцвет инкарнату описаны случаи побочных реакций.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, брадикардия, желудочковая тахикардия.

Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая васкулит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 2 или 5 блистеров в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Нобель ИЛАЧ САНА ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Санкаклар Коуи 81100 м. Стамбул, Турция.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).