

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum arsenicosum D8 - 22 мг, Aconitum napellus D3 - 22 мг, Argentum nitricum D8 - 22 мг, Arnica montana D4 - 22 мг, Baptisia tinctoria D4 - 22 мг, Bryonia D6 - 22 мг, Cortisonum aceticum D13 - 22 мг, Echinacea D3 - 22 мг, Eupatorium perfoliatum D6 - 22 мг, Euphorbium D6 - 22 мг, Gelsemium sempervirens D6 - 22 мг, Grippeimpfstoff Nosode D13 - 22 мг, Hepar sulfuris D10 - 22 мг, Hydrargyrum bichloratum D8 - 22 мг, Lachesis D10 - 22 мг, Phosphorus D8 - 22 мг, Phytolacca americana D6 - 22 мг, Pulsatilla pratensis D8 - 22 мг, Pyrogenium Nosode D198 - 22 мг, Rhus toxicodendron D4 - 22 мг, Sanguinaria canadensis D4 - 22 мг, Staphylococcus Nosode D18 - 22 мг, Streptococcus haemolyticus Nosode D18 - 22 мг, Sulfur D8 - 22 мг, Thuja occidentalis D8 - 22 мг, Zincum metallicum D10 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха и практически свободна от частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат иммуномодулирующего, противовоспалительного и дезинтоксикационного действия, которая базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Комплексное лечение острых и хронических воспалительных и гнойно-инфекционных заболеваний слизистых оболочек, внутренних органов и кожи, протекающие с выраженной интоксикацией и частыми рецидивами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных (в т. ч. *Arnica*, *Echinacea*), плюща ядовитого или другим компонентам препарата.

Туберкулез, лейкоз, воспалительные заболевания соединительных тканей (коллагенозы), аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз, заболевания системы крови, СПИД, ВИЧ-инфекции, иммуносупрессия или иммунодефицит различной этиологии и другие хронические вирусные заболевания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи воздействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Если применяют лекарственные средства с выраженной гепатотоксическим действием, вопрос о одновременный прием с препаратом "Эхинацея композитум С" решает врач индивидуально.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или отмечается ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.

При заболеваниях печени или при одновременном приеме гепатотоксических лекарственных средств препарат применять только после консультации с врачом.

При применении препарата более 4 недель необходимо контролировать показатели функции печени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью в связи с наличием в составе сангвинария канадской (*Sanguinaria canadensis*).

Способ применения и дозы

Разовая доза, одновременно является суточной взрослым и детям старше 12 лет - 2,2 мл детям в возрасте от 1 до 3 лет - 0,6 мл, от 3 до 6 лет - 1,0 мл, от 6 до 12 лет - 1,5 мл. Применять 1-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных, а при необходимости - внутривенных (струйно) инъекций, а также в акупунктурные точки.

Курс лечения - 2-6 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Не отмечалось. Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать желудочно-кишечные расстройства или кожные реакции, в том числе через несколько дней после применения препарата.

Во время лечения препаратами, содержащими *Sanguinaria canadensis*, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина в сыворотке крови до появления медикаментозной желтухи (медикаментозный токсический гепатит), которые уменьшались или нормализовались после прекращения приема препарата.

В редких случаях у лиц с повышенной чувствительностью к растениям семейства сложноцветных (в т. ч. *Arnica*, *Echinacea*) могут возникать реакции гиперчувствительности (до анафилактической реакции). Временно могут возникать реакции в месте инъекции, в том числе покраснение, опухание и боль.

После применения препаратов, содержащих экстракты эхинацеи, наблюдались реакции со стороны пищеварительного тракта (в т. ч. тошнота, боль в животе); менструальные расстройства; акне, кожная сыпь, зуд, крапивница; возбуждение, нарушение сна; в единичных случаях - отек лица, затрудненное дыхание (одышка), головокружение и снижение артериального давления.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).