

## **Состав**

*действующее вещество:* листья плюща экстракт густой;

1 мл (31 капель) раствора содержит листья плюща экстракта густого (*Hederae heliсis folii extractum spissum*) (2,2 - 2,9: 1) 0,04 г

*вспомогательные вещества:* пропиленгликоль, глицерин, масло аниса звездчатого, масло эвкалиптовое, ментол, масло мяты перечной.

## **Лекарственная форма**

Капли оральные, раствор.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная зеленовато-коричневый вязкий раствор с ароматным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05C A12.

## **Фармакодинамика**

Геделикс® капли без спирта - лекарственное средство растительного происхождения, содержит активное вещество листьев плюща экстракт густой, терапевтическое действие которого при воспалительных заболеваниях дыхательных путей основывается на секретолитическое, муколитическом и спазмолитическом действии гликозидных сапонинов, содержащихся в листьях плюща.

Терапевтическое действие предсказуемо обусловлено раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлекторно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

## **Фармакокинетика**

Отсутствуют данные о проведении испытаний.

## **Показания**

Симптоматическое лечение кашля при простудных заболеваниях дыхательных путей, хронических воспалительных заболеваниях бронхов.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства аралиевых, детский возраст до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов, бронхиальная астма и другие заболевания дыхательных путей, сопровождающихся выраженной чувствительностью дыхательных путей, недостаточность в организме аргининосукцинатсинтетазы (нарушение обмена веществ в цикле мочевины);
- склонность к ларингоспазму.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Особенности применения**

Если улучшения состояния больного не наступает, симптомы сохраняются в течение длительного времени (более 4-5 дней) или в случае появления приступов удушья, отхождение гнойной мокроты или мокроты с кровью, а также при повышении температуры тела следует немедленно обратиться к врачу.

Поскольку Геделикс® капли без спирта не содержит этанола и сахара, его можно применять больным сахарным диабетом.

Если улучшения состояния больного не наступает или беспокоит одышка, гнойная мокрота, а также при повышении температуры тела необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение детям 2-4 лет нуждается в рекомендации врача. Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, кодеин или декстрометорфан. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Предполагается, что лекарственное средство не оказывает действия при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

## Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

## Способ применения и дозы

Геделикс® капли без спирта следует применять неразбавленным, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

Детям рекомендуется давать препарат разведенным в фруктовом соке или чае.

Длительность лечения зависит от вида и тяжести заболевания, но даже при легком течении заболеваний дыхательных путей лечения необходимо проводить не менее одной недели. После исчезновения симптомов болезни лечение еще следует продолжить 2-3 дня.

Продолжительность применения препарата без консультации с врачом не должна превышать несколько дней.

Ниже приведена таблица применения препарата для разных возрастных групп.

| Возрастная группа                    | Разовая доза | Кратность приема | Суточная доза |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Взрослые и дети в возрасте от 10 лет | 31 капель    | 3 раза / сут     | 93 капли      |
| Дети 4-10 лет                        | 21 капель    | 3 раза / сут     | 63 капли      |
| Дети 2-4 года                        | 16 капель    | 3 раза / сут     | 48 капель     |

## Дети

Противопоказан детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

## **Передозировка**

*Симптомы:* тошнота, рвота, диарея, гастроэнтерит и возбуждения.

*Лечение:* симптоматическое.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы*

Аллергические реакции (преимущественно сыпь), включая одышку, отек слизистых оболочек, отек Квинке сыпь и крапивница, зуд, кожные реакции (кожная сыпь), купероз.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта*

У пациентов с повышенной чувствительностью иногда могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

## **Срок годности**

5 лет.

Срок годности после вскрытия флакона - 6 месяцев.

Образование осадка и помутнения препарата, которая может возникнуть при хранении в течение срока годности, не уменьшает активности препарата и не является препятствием для его применения.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

Флакон-капельница по 50 мл, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Кревель Мойзельбах ГмбХ

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Кревельштрассе 2, 53783 Айторф, Германия.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).