

Состав

действующие вещества: 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержащая:

160 мг экстракта травы чабреца сухого (4–8:1) (*Herba Thymi vulgaris*), (экстрагент этанол 70% (об/об));

60 мг экстракта корней первоцвета сухого (5,3–7,8:1) (*Radix Primulae*), (экстрагент этанол 47,4% (об/об));

другие составляющие: диметикон, лактозы моногидрат, глюкоза, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, гипромелоза, мяты перечный аромат, повидон, кросповидон, пропиленгликоль, полиакрилатная дисперсия, сахарин натрия (E 141), диоксид титана (E 171).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой зеленого цвета с полуматовой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Растительные компоненты, входящие в состав лекарственного средства, обладают секретолитическими и спазмолитическими свойствами.

Сапонины из корней первоцвета проявляют секретолитический эффект, достигаемый преимущественно с помощью рефлекторного механизма вследствие раздражения чувствительных нервных окончаний блуждающего нерва пищеварительного тракта.

Эфирные масла и флавоноиды травы тимьяна оказывают бронхоспазмолитическое и секретолитическое действие. Также был подтвержден антибактериальный эффект препарата, обусловленный тимоловым компонентом эфирного масла из чабреца.

Фармакокинетика

Тимоловый компонент эфирного масла травы чабреца выделяется легкими. Флавоноиды (например, апигенин, лютеолин) травы тимьяна расщепляются кишечной флорой и хорошо всасываются в кровь и выделяются либо в неизмененном виде, либо в виде метаболитов, главным образом почками.

Показания

Лечение острого бронхита и воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата, а также другим видам первоцветов или другим лекарственным растениям семейства губоцветных, к березе, полыни и сельдерее.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Возможно применение в сочетании с антибактериальными лекарственными средствами.

Особенности применения

Из-за содержания глюкозы и лактозы лекарственное средство не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или с нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Если симптомы сохраняются более 1 недели или возникает затруднение дыхания, лихорадка, выделение гнойной или кровянистой мокроты, больному следует немедленно обратиться к врачу.

Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять Бронхипрет ТП таблетки, покрытые оболочкой, без консультации с врачом.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка содержит в среднем 0,02 хлебной единицы (ХО). Таблетки не содержат глютенa.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность

В связи с недостаточностью данных по применению препарат не следует применять в период беременности или кормления грудью.

Фертильность

Нет данных о влиянии лекарственного средства на женскую способность к воспроизводству потомства. В экспериментальных исследованиях влияния на фертильность не наблюдалось.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям от 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Таблетки следует принимать не разжевывая, с достаточным количеством жидкости (преимущественно стаканом воды), перед едой.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 1 нед. При необходимости более длительного лечения больному следует обратиться к врачу. Смотрите также информацию в разделах «Особенности применения» и «Побочные реакции».

Дети

В связи с недостаточностью исследований по безопасности, препарат не следует применять детям до 12 лет.

Передозировка

Возможны желудочные расстройства, рвота и диарея. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Нечасто возникают желудочно-кишечные расстройства, включая спазмы, тошноту, рвоту, диарею. Очень редко возможны реакции гиперчувствительности, включая затруднение дыхания, сыпь, зуд, крапивницу, отек лица, рта и/или глотки.

В случае возникновения побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Если возникает аллергическая реакция, таблетки Бронхипрет ТП нельзя применять снова.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Для защиты от воздействия света хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика СЕ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г. Ноймаркт, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).