

Состав

действующее вещество: 1 капсула содержит 150 мг (0,15 г) эфирного масла лаванды;

вспомогательные вещества: желатин, глицерин, хинолин желтый (Е 104), сансет желтый (Е 110), метакрилатный сополимер (тип А), натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, полисорбат 80, глицерин моностеарат.

Лекарственная форма

Капсулы кишечнорастворимые мягкие.

Основные физико-химические свойства: овальные желтые кишечно мягкие капсулы с прозрачной подвижной светло-желтой или зеленовато-желтой жидкостью.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Тавипек обладает секретолитическим, отхаркивающим, муколитическим, эпителизирующим, противовоспалительным, противомикробным, иммуностимулирующим действием.

Секретолитическое действие препарата проявляется в повышении мукоцилиарного клиренса. Муколитическое и отхаркивающее действие обусловлено разрежением слизи и усилением функциональной активности реснитчатого эпителия, способствует более быстрому и легкому освобождению от слизи дыхательных путей. Противомикробная и противовоспалительная активность Тавипек вызвана бактерицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла лаванды и проявляется в угнетении общего роста бактерий.

Эфирное масло лаванды в исследованиях *in vitro* подавляет общий рост бактерий и грибов, в том числе микобактерий туберкулеза, причем не влияет на нормальную микрофлору кишечника. Тавипек дезактивирует стафилококковый токсин - альфа-гемолизин и стрептококковый токсин - стрептолизина, токсины, высвобождаются патогенными бактериями. Тавипек стимулирует неспецифические звенья иммунитета путем активации клеточного иммунитета, повышением фагоцитарной активности лейкоцитов.

Фармакокинетика

После приема 1,8-цинеола в кишечнорастворимых капсулах, меченных атомом эфирного масла лаванды, при максимальном периоде пребывания в пищеварительном тракте биодоступность не изменяется.

Показания

- острый бронхит;
- хронический бронхит;
- бронхектатична болестъ;
- кашель курильщика;
- синусит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь, гиперацидный гастрит, острый гепатит, панкреатит, нефрит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Предостережение относительно приема препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1-2 капсулы 3 раза в сутки, не разжевывая, во время еды. Срок лечения зависит от характера и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат применять для лечения детей в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Не описано. Симптомы передозировки эфирным маслом лаванды неизвестны. При передозировке вероятно возникновение тошноты и других гастроинтестинальных жалоб.

Побочные реакции

Редко может возникать отрыжка, кратковременная тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия. Нельзя исключить возможность развития аллергических реакций, включая кожные высыпания. При выдохе вероятно наличие запаха лавандового масла, не вызывает неприятных ощущений.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в картонной упаковке для защиты от света при температуре не выше 30 ° C.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармацеутише фабрик Монтавит ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).