

## **Состав**

*действующие вещества:* 10 г гранул содержат Cina 200CH 20 мг, Belladonna 30CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Acidum benzoicum 30CH 20 мг, Causticum 200CH 20 мг;

*вспомогательное вещество:* крупка сахарная.

## **Лекарственная форма**

Гранулы.

*Основные физико-химические свойства:* гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, стабилизирует нарушенные вегетативные функции.

## **Показания**

Первичный ночной энурез с нормальной концентрационной способностью почек; синдром раздраженного мочевого пузыря, спазмы и дискинезии; функциональная слабость мускулатуры мочевого пузыря в пожилом возрасте.

## **Противопоказания**

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

## **Особенности применения**

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества –крупки сахарной – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не содержит седативных компонентов и не влечет за собой дневной сонливости, поэтому не влияет на способность управлять транспортными средствами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Нет опыта применения препарата в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

*Взрослым и детям старше 3 лет* назначают по 5 гранул 1-2 раза в сутки курсами по 3 месяца с перерывом 2 недели.

*Детям от 1 до 3 лет* гранулы следует растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

Гранулы следует применять под язык до полного рассасывания за 15-20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

## **Дети**

Препарат не назначают детям до 1 года.

## **Передозировка**

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии.

## **Побочные реакции**

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обязательно обратиться к врачу.

**Срок годности**

3 года.

**Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

**Упаковка**

По 10 г гранул в полимерном пенале, в картонной пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).