

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 флакон (банка) содержит настойки из лекарственных растений [зверобоя травы (*Hyperici herba*), травы золотарника канадского (*Solidaginis canadensis herba*), травы пастушьей сумки (*Bursae pastoris herba*), травы репейника обыкновенного (парила лекарственного) (*Agrimoniae herba*), арники цветков (*Arnicae flos*), календулы цветков (*Calendulae flos*), валерианы корней (*Valerianae radix*), эхинацеи пурпурных корней (*Echinaceae purpureae radix*)] (1 : 4,4) (экстрагент этанол 70 %) – 100 мл;

*другие составляющие:* отсутствуют, кроме экстрагента.

## **Лекарственная форма**

Настойка перорального применения.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость золотисто-бурого цвета со слабым запахом валерианы. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Код АТХ G04C X.

## **Фармакодинамика**

Просталад сприяє нормалізації рівня простат-специфічного антигену та естріолу в крові, знижує перекисне окиснення ліпідів у передміхуровій залозі, зменшує розмір збільшеної передміхурової залози, нормалізує діурез, зменшує клінічні прояви ДГПЗ та має помірний знеболювальний ефект. Фармакологічні властивості настойки зумовлені дією компонентів, що входять до її складу.

## **Показания**

Применять для профилактики и в составе комплексного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЗ) в начальной стадии заболевания (при затруднении мочеиспускания) и инфекции мочевыводящих путей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства (в том числе растениям семейства сложноцветных); алкоголизм в анамнезе, употребление препаратов, содержащих алкоголь, и собственно алкоголя; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; цирроз печени; прием нейролептиков и транквилизаторов; артериальная гипертензия, повышенная свертываемость крови, тромбоэмболия (в анамнезе); сахарный диабет; туберкулез; заболевание лейкоцитарной системы крови (лейкоз, агранулоцитоз); ревматизм; заболевания соединительной ткани (коллагенозы); онкологические заболевания; рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания, системная красная волчанка, иммуносупрессия или иммунодефицит разной этиологии и другие хронические вирусные заболевания, ВИЧ-инфекции, СПИД; депрессия и другие нарушения, сопровождающиеся угнетением центральной нервной системы.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Лекарственное средство не следует применять в сочетании с нейролептиками, транквилизаторами, снотворными и препаратами, содержащими алкоголь.

Просталад не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксическим действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты. Настойка способна потенцировать действие сердечных, седативных, анальгетических и спазмолитических средств. Не рекомендуется применение пациентам, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды. В результате иммуностимулирующего действия эхинацея может снижать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

### **Особенности применения**

Во время лечения препаратом требуется регулярный контроль функции мочеполовой системы.

При язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью применять вместе с антацидами и спазмолитиками.

Лекарственное средство содержит этанол.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не обнаружено.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат предназначен для применения только для мужчин.

## **Способ применения и дозы**

Препарат принимать взрослым мужчинам внутрь по 1 чайной ложке 2 раза в день, предварительно разведя в 50 мл воды. Продолжительность курса лечения – до 3 месяцев.

## **Дети**

Не назначать детям.

## **Передозировка**

В случае передозировки возникают следующие симптомы.

*Со стороны центральной нервной системы:* сонливость, подавленность, бессонница, расстройства сна, повышенная возбудимость нервной системы, головные боли, головокружение, общая слабость, снижение остроты слуха и зрения, сердцебиение, психическое возбуждение.

*Со стороны пищеварительной системы:* диарея, тошнота, рвота, запоры, боли в животе; ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени.

*Со стороны системы кроветворения:* повышение активности системы свертывания крови.

Вышеуказанные симптомы проходят самостоятельно после отмены препарата в течение суток.

При передозировке следует прекратить применение препарата. Терапия симптоматическая.

## **Побочные реакции**

В отдельных случаях при повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, зуд,

гиперемия, отек кожи, ангионевротический отек, крапивница, синдром Стивенса – Джонсона, анафилактический шок. При длительном применении – снижение АД, гиперкоагуляция; затруднение дыхания, бронхоспазм с обструкцией, бронхиальная астма, головокружение; артериальная гипотензия; тошнота; рвота; сухость во рту; боль в животе; запор или диарея. Были отдельные сообщения о возможной связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узелковая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена – Ларсена с нарушением тубулярной функции почек). При длительном применении (более 8 недель) может возникнуть лейкопения; угнетение эмоциональных реакций, сонливость, снижение работоспособности; головокружение, головные боли; полиурия; потливость, озноб; фотосенсибилизация (при лечении следует избегать УФ-излучения).

### **Срок годности**

3 года.

Не применять лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 100 мл во флаконах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЧАО «Биолик».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 24321, Винницкая область, г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, III.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).