

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат: Bryonia alba 200CH 20 мг Spongia 200CH 20 мг Ipecacuanha 200CH 20 мг Verbascum 50CH 20 мг Kalium bichromicum 200CH 20 мг

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Облегчает кашель, способствует отхождению мокроты, уменьшает воспаление дыхательных путей.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении: заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем; лечение и профилактика рецидивов острых и хронических ларингитах, трахеитах, бронхитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахароз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - сахара кондитерского - проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалась, поэтому его не рекомендуется применять во время беременности и в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 7 лет - по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте от 3 до 7 лет - из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием), гранулы растворяют в небольшом количестве воды в случае невозможности применения под язык. Лекарственное средство следует принимать за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 2-6 раз в сутки, в зависимости от тяжести состояния, до полного выздоровления.

При остром начале заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 2-6 раз в сутки.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки в течение 7 дней с целью профилактики осложнений.

При хронических бронхитах принимать 1-2 раза в сутки. Курс лечения - 2-3 месяца.

При необходимости курс повторить через 2-3 недели.

Дети

Рекомендуется детям от 3 лет.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 10 г в пенале; по 1 пенала в пачке из картона; по 10 г во флаконе с крышкой; по 1 флакону с крышкой в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

«Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., Г.. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).