

Состав

действующее вещество: сухого экстракта плюща листья;

1 мл сиропа содержит сухого экстракта плюща листьев (*Hederis folia*) [(4-8): 1] (экстрагент - этанол 30%) при содержании гедеракозиду С 14% - 4,5 мг;

вспомогательные вещества: сорбита раствор, который не кристаллизуется (Е 420), ксантановая камедь; натрия карбоксиметилцеллюлоза; калия сорбат; ароматизатор «Черная смородина 522»; кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сиропоподобная жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом, сладкого вкуса. В процессе хранения допускается опалесценция и образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Основными биологически активными веществами плюща листьев экстракта сухого являются сапонины гликозиды, усиливающие секрецию бронхиальных желез, оказывают секретолитические, отхаркивающие, а также общеукрепляющие и тонизирующие свойства.

Благодаря содержанию дубильных веществ, пектинов, смолы, эфирного масла препарат оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства аралиевых. Возраст до 2 лет - из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. Непереносимость фруктозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с другими лекарственными средствами нежелательного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками.

Особенности применения

Применение детям 2-4 лет нуждается в рекомендации врача. Если симптомы заболевания не исчезают в течение длительного времени (более 4-5 дней) или появляется одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота или мокроты с кровью, следует немедленно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, с кодеином или декстрометорфаном без консультации врача. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Сорбит может вызвать незначительное слабительное действие.

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью. Перед применением препарата врач должен взвесить соотношение риск / польза для этой группы пациентов.

Способ применения и дозы

Перед каждым применением необходимо тщательно взбалтывать флакон.

Внутренне применять детям в возрасте от 2 до 6 лет по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки; детям в возрасте от 6 до 10 лет - по 5 мл сиропа 3 раза в сутки, взрослым и детям старше 10 лет - по 5-7,5 мл сиропа 3 раза в сутки с помощью дозирующей стаканчика, который прилагается.

Сироп следует применять утром, днем и вечером.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет до 7 дней. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжить терапию еще 2-3 суток после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Дети

Препарат противопоказан детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

Передозировка

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться аллергические реакции (преимущественно сыпь), включая одышку, отек слизистых оболочек, крапивницу, зуд, купероз; желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

Срок годности

5 лет.

После вскрытия упаковки препарат годен в течение 6 месяцев.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 90 мл во флаконе или банке с дозирующим стаканчиком в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).