

Состав

действующие вещества: 100 мл препарата содержит: Populus D1 7 мл, Sabal D6 10 мл, Conium D6 10 мл, Kalium iodatum D12 10 мл, Ferrum picrinicum D12 10 мл

вспомогательные вещества: этанол 43% (м/м).

1 мл раствора содержит 25 капель.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная от желтоватого до коричневато-оранжевого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат Гентос® оказывает комплексное воздействие на урогенитальную систему. Компоненты дополняют эффективность друг друга, тем самым расширяя диапазон терапевтического действия.

Гентос восстанавливает физиологический баланс половых гормонов: способствует нормализации нейрогуморальной регуляции в системе «гипоталамус-гипофиз-тестикулы», уровня тестостерона, 5α-дигидротестостерона и эстрадиола, устраняет возрастной андрогенный дефицит.

Оказывает антипролиферативное действие на простату: тормозит увеличение предстательной железы. Восстанавливает нормальное мочеиспускание (уменьшает задержку и усиливает струю мочи, облегчает процесс опорожнения мочевого пузыря, снижает частоту мочеиспусканий, в том числе в ночное время).

Влияет как на механический (прекращение разрастания стромальной ткани), так и на динамический компонент (нормализация тонуса гладкой мускулатуры детрузора и стенки мочевого пузыря) формирование дизурии.

Оказывает влияние на резервуарную и эвакуаторную функции мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию, венозный отток в тканях урогенитальной зоны.

Уменьшает выраженность инфравезикальной обструкции, вызванной отеком простаты.

Оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное и противоотечным действием, нормализует кровообращение и уменьшает застойные явления в органах малого таза, таким образом устраняет одну из основных причин развития и обострения простатита, обеспечивает профилактику воспалительных осложнений у больных аденомой.

У больных простатитом препарат уменьшает расстройства мочеиспускания, рези и боль при мочеиспускании, интимной близости.

Усиливает кавернозный кровоток и эректильную функцию у больных хроническим простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, уменьшает риск развития бесплодия и импотенции. Нормализует состав секрета простаты.

Фармакокинетика

Не исследовались.

Показания

В комплексном лечении острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) заболеваний мочевого пузыря (атония мочевого пузыря, цистит) у мужчин и женщин; нарушений мочеиспускания различного происхождения, в том числе в послеоперационном периоде.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к вспомогательному веществу препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время нет информации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.

Особенности применения

Гентос капли оральные не следует применять пациентам с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (10 капель) содержится 160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата беременным, кормящим грудью, детям и пациентам с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Не использовать при заболеваниях щитовидной железы без консультации врача.

При повышении температуры или появлении крови в моче необходимо срочно проконсультироваться с врачом.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применения лекарственного средства должно быть прекращено.

Поскольку Гентос содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет или оказывает совсем незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Взрослые: 10 капель, разведенных в небольшом количестве воды.

Принимать 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, рекомендован прием препарата каждые полчаса-час до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3-х суток, после чего принимать 3 раза в сутки.

Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием.

Курс лечения

При остром простатите, остром цистите курс лечения составляет 2 недели.

При доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы, хроническом простатите, хроническом цистите, атонии мочевого пузыря, хронических нарушениях мочеиспускания различного происхождения курс лечения - 3 месяца. При стабилизации состояния возможен переход на 1-2 разовый поддерживающий прием.

Дети

Применение препарата Гентос® капли оральные детям и подросткам в возрасте до 18 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

Передозировка

Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Побочные реакции

Не обнаружены.

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Лекарственное средство хранить в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).