

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Populus D1 25,0 мг, Sabal D6 37,2 мг, Conium D6 37,2 мг, Kalium iodatum D12 37,2 мг, Ferrum picrinicum D12 37,2 мг

вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки от белого до слегка желтоватого цвета с возможными вкраплениями, с распределительной чертой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат проявляет комплексное лечебное воздействие на мочеполовую систему.

У больных доброкачественной гиперплазией (аденомой) предстательной железы восстанавливает физиологический баланс половых гормонов, тормозит рост предстательной железы и улучшает работу мочевого пузыря, восстанавливает нормальное мочеиспускание (уменьшает задержку и усиливает струю мочи, облегчает процесс опорожнения мочевого пузыря, снижает частоту мочеиспусканий, в том числе в ночное время).

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, улучшает кровообращение и уменьшает застойные явления в органах малого таза, таким образом устраняет одну из основных причин развития и обострения простатита, обеспечивает эффективную профилактику воспалительных осложнений у больных аденомой.

У больных простатитом препарат уменьшает расстройства мочеиспускания, рези и боль при мочеиспускании, при половом акте. Улучшает состав секрета простаты, что необходимо для реализации человеком репродуктивной функции. Восстанавливает кавернозный кровоток, улучшает половую функцию больных простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы,

уменьшает риск развития бесплодия и импотенции.

Показания

Применять в комплексном лечении нарушений мочеиспускания, легких форм гиперплазии предстательной железы и атонии мочевого пузыря.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания щитовидной железы (гипертиреоз). Повышенная чувствительность к салицилатам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата Гентос® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не следует применять одновременно с мазями, содержащими камфору, поскольку они могут влиять на действие препарата Гентос®.

При применении зубных паст и капель, имеющих интенсивный запах, обусловленный наличием ментола и эвкалипта, препарат следует принимать за полчаса до или через полчаса после их применения.

При одновременном применении лекарственных средств, содержащих *Populus tremuloides* с ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП существует повышенный риск кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

При одновременном применении лекарственных средств, содержащих *Sabal serrulatum* с антикоагулянтами (например варфарин, клопидогрел, фенпрокумон) эффект антикоагулянтов может усилиться.

При одновременном применении лекарственных средств, содержащих *Sabal serrulatum* с антиандрогенами эффект антиандрогенов может усилиться. Во время заместительной гормональной терапии тестостероном или другими андрогенами их эффективность может ослабнуть.

Особенности применения

1 таблетка содержит 226,7 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции

необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат. С осторожностью применять препарат больным с нарушением свертывания крови перед хирургическими или стоматологическими вмешательствами, поскольку есть данные, что лекарственные средства, содержащие *Sabal serrulatum* могут увеличить кровотечение.

С осторожностью применять препарат пациентам с высоким артериальным давлением. Необходимо периодически контролировать уровень артериального давления.

В начале лечения могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить.

При повышении температуры или появлении примеси крови в моче, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных позывах к мочеиспусканию, сочетающиеся с внезапной невозможностью мочеиспускания (острая задержка мочи) необходимо немедленно обратиться к врачу.

Поскольку Гентос® содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и скорость реакции при работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные по применению препарата во время беременности и кормления грудью отсутствуют.

Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Данные о влиянии на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Взрослые: по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Для ускорения выздоровления в начале лечения, а также в случаях, когда требуется быстрое устранение симптомов, возможен прием препарата 4 раза в сутки. После улучшения состояния принимать 2 раза в сутки.

Для достижения максимального эффекта препарат Гентос® следует принимать за 30 мин до или через 1 час после еды. Таблетку рекомендуется держать во рту до полного растворения.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести течения заболевания.

В случае отсутствия осложнений лекарственное средство можно применять в течение 3 месяцев.

Если симптомы заболевания сохраняются более 7 дней от начала лечения или появляются новые симптомы при длительном лечении, необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети

Детям (до 18 лет) не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных относительно применения.

Передозировка

Случаи передозировки не обнаружены.

Побочные реакции

В исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).