

Состав

действующее вещество: бузины черной цветки (*Sambuci nigrae flores*);

1 фильтр-пакет содержит бузины черной цветков (*Sambuci nigrae flores*) 1,5 г.

Лекарственная форма

Цветки.

Основные физико-химические свойства: цельная сырье: отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без них с примесью веточек, соцветий и листьев. Цвет желтый;

порошок крупный: смесь измельченных кусочков цветков и бутонов с примесью цветоножек, веточек и листьев различной формы. Цвет желтый с буроватыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают потогонное, противовоспалительное, обезболивающее, мочегонное и мягкое отхаркивающее действие.

Показания

Грипп, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, ларингиты), почек и мочевого пузыря - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл ($\frac{1}{2}$ стакана) кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым и детям старше 16 лет принимать в теплом виде по $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день после еды. Детям 3-7 лет - по 2 десертные ложки 3 раза в день после еды 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3 раза в день после еды 12-16 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана 3 раза в день после еды.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При возникновении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПрАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.