

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит экстракта черной редьки сухого (*Raphani sativi nigri radicis*) (15 - 21: 1) с углем активированным (1: 1) 150 мг (экстрагент этанол 85%); экстракта травы артишока густого (*Cynarae herbae*) 47 мг (экстрагент этанол 50%); кислоты дегидрохолевой 40 мг масла, мяты перечной 15 мг;

вспомогательные вещества: сахароза, повидон, целлюлоза микрокристаллическая, гуммиарабик (Е 414), кальция гидрофосфат дигидрат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, краситель Pigment Blend PB-277000: железа оксид черный (Е172), титана диоксид (Е 171).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые с блестящей поверхностью, покрытые оболочкой черного цвета.

На изломе - черное ядро, окруженное белой и черной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени, желчевыводящих путей.

Препараты, применяемые при билиарной патологии.

Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Комплексный препарат оказывает желчегонное действие и стимулирует желчеобразующую функцию печени. Препарат непосредственно влияет на печень, стимулирует секреторные функции и увеличивает количество желчи. Имеет защитное влияние на паренхиму печени, усиливает перистальтику кишечника, оказывает также спазмолитическое и мочегонное действия.

Показания

Диспепсические явления, гипотоническая дискинезия желчного пузыря.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим растениям семейства сложноцветных. Тяжелые заболевания печени, тяжелая

печеночная недостаточность, непроходимость (в т. ч. обструкция, стеноз) желчных путей, острые и хронические воспаления желудка и кишечника, желчнокаменная болезнь, эмпиема желчного пузыря.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В высоких дозах с гипотензивными и мочегонными средствами может привести к гипокалиемии.

При одновременном применении с гипохолестеринемическими средствами усиливается эффект Рафахолина Ц.

Особенности применения

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей.

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения листьев мяты перечной, поскольку может увеличиться изжога.

Если симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют, а такая же в случае возникновения диареи, боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Препарат не применять при острых заболеваниях почек.

Препарат содержит сахарозу, поэтому его не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозы/галактозы и сахарозы/изомальтозы.

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахарозу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность использования в период беременности и кормления грудью не исследовалась, поэтому в этот период не рекомендуется применение препарата.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь.

Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 или 2 таблетки 3 раза в сутки

после еды.

При вздутии живота - взрослым по 2 таблетки утром и вечером, за полчаса до приема пищи.

Дети

Клинических исследований по применению препарата детям до 12 лет не проводилось.

Передозировка

Симптомы: рвота, понос, головная боль, покраснение лица, нарушение дыхания, нарушения сердечного ритма, тахикардия, возбуждение, мышечные сокращения, ощущение усталости, тошнота или усиление побочных эффектов.

Лечение. Отмена препарата. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: диарея/жидкий стул, желчная колика, дискомфорт в эпигастральной области, желудочно-пищеводный рефлюкс, изжога, тошнота.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит).

При появлении аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С в сухом, защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток в блистере. По 1 блистеру в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Вроцлавское Предприятие Лекарственных Трав «Гербаполь» АО.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

65/68, ул. Св. Николая 50-951 Вроцлав, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).