

Состав

действующее вещество: расторопши плоды измельченные;

1 пачка содержит расторопши плодов измельченных 50 г или 100 г, или 200 г.

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: кусочки плодов различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями 3 мм; от светло- до темно-коричневого или черного цвета. Запах специфический, слабый, присущий сырье, без посторонних запахов, без запаха цвилости. Вкус слегка горьковатый, специфический, без посторонних привкусов.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Код АТХ А05В А.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах расторопши пятнистой (флавоноид силимарин и его главный изомер силибин), обуславливают гепатопротекторное, желчегонное, холеретическое, мембраностабилизирующее действие лекарственного средства, а именно: нормализует обменные процессы в печени, повышают устойчивость гепатоцитов к действию негативных факторов окружающей среды, способствуют быстрому восстановлению паренхимы печени и ее физиологических функций, а также усиливают образование и выделение желчи, секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексной терапии хронических гепатитов, хронических холециститов, стеатоза печени, токсических поражений печени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Особые меры безопасности.

Препарат следует применять в соответствии с рекомендациями врача и в рекомендованных дозах. Не применять для лечения острых состояний.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими препаратами неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Женщинам в период беременности и кормления грудью рекомендуется применять препарат только по жизненным показаниям, под контролем врача.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку плодов залить 1 стаканом кипятка, настоять 10-20 минут и процедить. Принимать теплым, небольшими глотками, по 1 стакану 3 раза в сутки: утром натощак, в обед за 30 минут до еды и вечером - перед сном.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства детям не установлены, поэтому не рекомендуется назначать Расторопши плоды этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Обычно препарат хорошо переносится больными, но возможны слабительное действие, увеличение диуреза, аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).