

Состав

действующее вещество: cynara scolymus;

1 капсула содержит артишока экстракта сухого (Extractum Cynarae siccum) (7,5:1) (экстрагент - вода очищенная), в пересчете на сухое вещество 100 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат, кросповидон; оболочка капсулы содержит титана диоксид (Е 171), желтый закат FCF (Е 110), желатин (дозировка 100 мг) или титана диоксид (Е 171), эритрозин (Е 127), хиолин желтый (Е 104), индиго (Е 132), желатин (дозировка 300 мг).

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом оранжевого цвета (дозировка 100 мг) или с крышечкой зеленого цвета и корпусом желтого цвета (дозировка 300 мг). Содержимое капсул - мелко гранулированный порошок от светло-коричневого с серым оттенком до темно-коричневого с серым оттенком цвета. Допускается наличие включений белого цвета, порошка и агрегатов частиц порошка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, содержит экстракт артишока. Оказывает желчегонное, гепатопротекторное, мочегонное действие.

Фармакологический эффект обусловлен комплексом биологически активных веществ, входящих в состав препарата: цинарин, хлорогеновая кислота, аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В, инулин. Основное действующее вещество препарата - цинарин - имеет, в основном, холеретическое действие. Холекинетическое действие выражено в меньшей степени. Аскорбиновая кислота, каротин, витамины группы В и инулин улучшают процессы обмена.

Препарат стимулирует желчеотделение, снижает уровень холестерина в крови, стимулирует регенерацию гепатоцитов, оказывает мочегонное и гиполипидемическое действие. Уменьшает чувство переполнения или растяжения желудка, устраняет спазм.

Способствует выделению из организма мочевины, креатинина, а также токсинов (в т. ч. нитросоединений, алкалоидов, солей тяжелых металлов).

Показания

Дискинезия желчных путей по гипотонически-гипокинетическому типу, хронический некалькулезный холецистит, хронический гепатит различной этиологии, хроническая почечная недостаточность, хронические интоксикации (гепатотоксическими веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов), диспепсические расстройства (тяжесть в эпигастрии, метеоризм, тошнота, отрыжка).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата/других растений семейства сложноцветных (астровых), непроходимость желчных или мочевыводящих путей, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, острый гепатит, тяжелая печеночная недостаточность, острые заболевания почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если пациент принимает любые другие лекарственные средства, обязательно следует проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата.

Препарат может ослаблять действие антикоагулянтов типа кумарина, что требует коррекции дозы последних. При одновременном применении с гипоазотемическими средствами возможно усиление гипоазотемических и гипохолестеринемических эффектов.

Особенности применения

Следует обязательно сообщить врачу о предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.

Перед первым приемом препарата следует проконсультироваться с врачом. Без консультации врача не следует применять препарат дольше установленного

срока.

Применять с осторожностью при заболеваниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей и при тяжелых заболеваниях печени. Если симптомы заболевания не исчезают или постоянно рецидивируют, а также в случае возникновения диареи или боли в животе лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

В период лечения следует воздерживаться от употребления алкоголя. При длительном применении препарата снижается уровень азотосодержащих веществ и холестерина в крови.

Препарат содержит лактозу, поэтому, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Краситель "желтый закат" FCF (E 110) может вызывать аллергические реакции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности возможно по назначению врача только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Дозу и длительность применения врач устанавливает индивидуально в зависимости от тяжести заболевания!

Принимать за 15-30 мин до еды. Взрослым и детям старше 12 лет - по 200-300 мг 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 100 мг 3 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения составляет 2-4 недели. Лечение можно повторить после перерыва в 1-2 месяца, согласовав с врачом.

Дети

Применять детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление побочных эффектов препарата.

Лечение: отмена препарата, промывание желудка, симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует.

Побочные реакции

При длительном применении препарата в высоких дозах возможны диарея, боль в верхней части живота, тошнота и изжога, аллергические реакции.

В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует обязательно посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Капсулы по 100 мг № 10 × 6 в блистерах в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания» Здоровье ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).