

Состав

1 капсула содержит:

- Экстракт семян расторопши пятнистой (силимарин) - 140 мг.
- Обогащенные фосфолипиды (лецитин) - 100 мг.
- Альфа-липоевая кислота - 50 мг.

вспомогательные вещества: (лактоза, крахмал, кальция или магния стеарат) - 110 мг.

Фармакологические свойства

- Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав обогащенных фосфолипидов (лецитина) и биологически активных веществ, содержащихся в экстрактах лекарственных растений: расторопши пятнистой (семян), артишока (листьев), куркумы (корня) и бессмертника песчаного (цветов).
- Действие всех активных компонентов клинически подтверждено.
- Обогащенные фосфолипиды и экстракты лекарственных растений, входящие в состав препарата, благодаря рационально подобранной комбинации, а также соотношению компонентов, и комплексному воздействию на гепатобилиарную зону, обеспечивают мощный гепатопротекторный эффект и значительно усиливают дренажную функцию печени, обуславливая тем самым выведение с желчью токсических продуктов метаболизма и экзогенных токсинов.
- Холеретический и холекинетический эффекты экстрактов лекарственных растений, содержащихся в препарате, приводят к уменьшению вязкости желчи и снижению ее литогенности, что создаёт условия для обратного развития мелких конкрементов желчного пузыря и желчевыводящих протоков.

Показания

Обогащенные фосфолипиды, силимарин и альфа-липоевая кислота, входящие в состав препарата, применяются:

- для профилактики токсических воздействий на печень, связанных с длительным применением лекарственных препаратов (антибиотикотерапия, химиотерапия и т.д.), приемом алкоголя, курением и влиянием неблагоприятных экологических факторов;

- в качестве сопутствующего средства для нормализации процессов пищеварения, обмена веществ и деятельности гепатобилиарной зоны при аллергических и кожных заболеваниях;
- в качестве вспомогательного средства для нормализации процессов пищеварения, обмена веществ и деятельности гепатобилиарной зоны при приеме лекарственных препаратов, действие которых направлено на снижение избыточной массы тела;
- в комплексной терапии хронических гепатитов различной этиологии, цирроза печени.

Противопоказания

- индивидуальная чувствительность к компонентам;
- не принимать детям до 8-ми лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортными средствами и механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение женщинам в период беременности и лактации возможно только по назначению врача.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка по возрастным ограничениям:

- взрослым и детям старше 12-ти лет - по 1-2 капсулы три раза в день во время еды, запить водой;
- детям с 8-ми до 12-ти лет - по 1 капсуле три раза в день во время еды, запить водой.

Курс приема 30-40 дней.

Перерыв 2 недели.

При необходимости курс можно повторить.

При назначении врача возможно длительное применение в течение 4-6 месяцев.

В качестве профилактического средства - по 1 капсуле 2 раза в день во время еды в течение 30-40 дней, перерыв - 2 недели (при необходимости курс можно повторить).

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции на отдельные компоненты препарата.

В случае значительного промежутка времени между приемом препарата и следующим приемом пищи могут возникать легкие диспепсические явления (тошнота, ощущение горечи во рту), проходящие после начала еды.

При применении препарата в неоправданно высоких дозах возможны диспепсические явления: тошнота, рвота, диарея (показано симптоматическое лечение, промывание желудка, прием энтеросорбентов).

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света помещении, при температуре от 18 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не больше 75%. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 капсул в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ", Украина.