

Состав

действующие вещества: 5 мл сиропа содержат: адхатоды сосудистой (*Adhatoda vasica*), листья экстракта густого (3,25: 1), (экстрагент вода) 92,31 мг солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*), корней экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода) 11,54 мг перца длинного (*Piper longum*), плодов экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода), 15,38 мг фиалки душистой (*Viola odorata*), цветков экстракта густого (3,25: 1) , (экстрагент вода) 3,85 мг иссопа лекарственного (*Hyssopus officinalis*), цветков экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода) , 7,7 мг калгана большого (*Alpinia galanga*) корневищ и корней экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода) 7,7 мг кордия широколистной (*Cordia latifolia*) плодов экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода), 15,38 мг алтея лекарственного (*Althaea officinalis*), семена экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода), 15,38 мг зизифуса обычного (*Zyzyphus vulgaris*), плодов экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода), 15,38 мг оносмы прицветные (*Onosma bracteatum*), листья и цветков экстракта густого (3,25: 1) (экстрагент вода) 15,38 мг;

вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, глицерин, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), пропиленгликоль, масло мяты перечной, масло гвоздичное, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства.

Однородный сироп коричневого цвета со вкусом мяты перечной и специфическим запахом. Допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях. Код АТХ R05 X.

Фармакодинамика

Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическим и жаропонижающими свойствами. Улучшает секреторную функцию эпителия дыхательных путей, поверхностно-активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что положительно влияет на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает выход слизи из дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик.

Фармакокинетика

Исследования показали, что применение препарата уменьшает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отеки слизистых оболочек. Изменения выраженности кашля наблюдаются через 3 - 4 дня приема препарата.

Показания

Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся сухим раздражающим кашлем; бронхит (острый и хронический); фарингит, трахеит, трахеобронхит.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет.
- Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия, тяжелая степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми средствами, которые уменьшают отхождения мокроты (таких как, кодеин).

При необходимости применения каких-либо других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Сироп содержит сахар, на что должны обратить внимание люди, которые придерживаются низкокалорийной диеты.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

С осторожностью и только по назначению врача применяют препарат в период беременности и кормления грудью только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

Применять перорально.

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3 - 4 раза в сутки.

Детям в возрасте от 7 до 11 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 4 раза в сутки.

Детям в возрасте от 3 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 1 до 2 лет - по 1/2 чайной ложки (2,5 мл) 3 - 4 раза в сутки.

Продолжительность лечения - от 3 до 7 дней.

Дети

Детям в возрасте до 1 года препарат не назначать.

Передозировка

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может вызвать нарушение водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемической миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов.

Сообщений о случайной передозировке не поступало.

Побочные реакции

При применении препарата возможны слабость, повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе высыпания, гиперемия кожи, анальный эритема, зуд, крапивница, ангионевротический отек) усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 90 мл или 120 мл, или 150 мл сиропа во флаконах № 1 в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед/ Herbion Pakistan Private Limited.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Участок № 30 сектор 28, Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан / Plot № 30 Sector 28, Korangi Industrial area, Karachi, Pakistan.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).