

Состав

действующие вещества: 100 мл капель содержат водного субстрата метаболитов: *Escherichia coli*, DSM 4087 - 24,9481 г, *Enterococcus faecalis*, DSM 4086 - 12,4741 г, *Lactobacillus acidophilus*, DSM 4149 - 12,4741 г и водного концентрата метаболитов: *Lactobacillus helveticus*, DSM 4183 - 49,8960 г

вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата гептагидрат, калия фосфат, кислота молочная, фосфорная кислота концентрированная, калия сорбат, кислота лимонная.

Лактоза входит в состав препарата как продукт жизнедеятельности бактерий.

Лекарственная форма

Капли оральные, раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, желтовато-коричневого цвета раствор с характерным кисловатым ароматом карамели, в течение срока хранения могут появляться взвешенные частицы коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм.

Антидиарейные препараты; средства, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника. Антидиарейные микробные препараты. Код АТХ А07F А.

Фармакодинамика

Капли Хилак форте - лекарственное средство, нормализует кишечную флору, pH и водно-электролитный баланс в просвете кишечника и стимулирует синтез эпителиальных клеток кишечной стенки.

Естественная физиологическая микрофлора кишечника может быть значительно нарушена вследствие таких внешних воздействий, как терапия антибиотиками, облучение, хирургические вмешательства на желудке (операция Бильрот II), а также в результате нарушения питания, иногда может стимулировать чрезмерное размножение патогенных микробов. В результате возникают ощущения тяжести, метеоризм, понос или запор.

Введенные в состав лекарственного средства Хилак форте многочисленные продукты обмена физиологических кишечных микробов (производителей

молочной кислоты, а также грамположительных и грамотрицательных симбионтов тонкого и толстого кишечника) способствуют сохранению физиологической функции слизистой оболочки кишечника и восстановлению его нормальной флоры.

Благодаря тому, что Хилак форте содержит биосинтетическую молочную кислоту и ее буферные соли, нормализуется кислотность в кишечнике.

Летучие кислоты жирного ряда, содержащиеся в каплях Хилак форте, делают возможными не только профилактику, но и восстановление поврежденной кишечной среды при инфекционных желудочно-кишечных заболеваниях, они также способствуют всасыванию воды и электролитов (натрий, хлор).

Хилак форте не всасывается в кровь, выводится через желудочно-кишечный тракт.

Показания

- Расстройства пищеварения, такие как метеоризм, диарея, запор;
- во время и после терапии с применением антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, а также радиотерапии;
- расстройства печеночного метаболизма;
- гастроинтестинальные расстройства, обусловленные пониженной кислотностью;
- хронический атрофический гастроэнтерит («сенильный кишечник»);
- желудочно-кишечные расстройства, связанные с изменением климата (в частности, поездка в теплые страны);
- симптомы, связанные с хронической кишечной интоксикацией, такие как тошнота, нарушения кровообращения, склонность к быстрому утомлению и тому подобное.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острая диарея, сопровождающаяся высокой температурой и наличием крови в кале.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Следует избегать одновременного применения с антацидными средствами.

Препарат имеет значение pH, соответствует кислой среде, поэтому может вызвать свертывание молока. Поэтому Хилак форте не следует применять с молоком.

Особенности применения

Хилак форте нельзя применять без предварительного разведения (можно разводить водой, чаем, апельсиновым соком). 1 мл лекарственного средства Хилак форте содержит 20 капель.

Следует посоветоваться с врачом при возникновении серьезных симптомов, например острой диареи с высокой температурой или кровью в кале, если диарея продолжается более 2 дней или появляются другие устойчивые или невыясненные желудочно-кишечные симптомы.

При возникновении диареи, особенно у детей и пожилых пациентов, обязательным при лечении является пополнение потери жидкости и электролитов.

Препарат Хилак форте следует с осторожностью назначать больным с повышенной кислотностью желудочного сока при наличии рефлюкс-эзофагит. Суточная доза для таких больных не должна превышать 6 мл, которую следует принимать не менее чем за 3 приема.

Хилак форте содержит лактозу. Поэтому не следует назначать пациентам при наличии редких наследственных форм непереносимости галактозы, дефицита лактазы или нарушение абсорбции глюкозы-галактозы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет достаточных эпидемиологических данных по выявлению потенциального риска применения препарата во время беременности и кормления грудью. Перед применением препарата Хилак форте в период беременности и кормления грудью следует оценить соотношение польза/риск.

Способ применения и дозы

Хилак форте принимают внутрь до или во время еды, разведя в небольшом количестве жидкости (за исключением молока).

Хилак форте в первые несколько дней болезни назначают 3 раза в сутки:

- взрослым и детям старше 12 лет - по 40-60 капель на прием;
- детям от 2 до 12 лет - по 20-40 капель на прием.

После улучшения состояния дозу можно уменьшить вдвое.

Больным с повышенной кислотностью желудочного сока и изжогой, часто связывается с этим состоянием, суточную дозу следует разделить не менее на 3 приема.

Продолжительность применения определяют индивидуально.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 2 лет.

Передозировка

Случаев передозировки не наблюдалось.

Побочные реакции

По частоте побочные эффекты распределены следующим образом: редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$).

Со стороны иммунной системы: редко: реакции гиперчувствительности в виде кожных реакций и реакций слизистой оболочки.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень редко: незначительный дискомфорт в брюшной полости.

Срок годности

5 лет.

После вскрытия флакона - 12 месяцев.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Препарат не требует специальных условий хранения.

Упаковка

По 100 мл во флаконе с пробкой-капельницей; по 1 флакону в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Меркле ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Людвиг-Меркле-Штрассе 3, 89143 Блаубойрен, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).