

Состав

действующие вещества:

1 таблетка содержит Acidum arsenicosum D6 - 30 мг, Argentum nitricum D6 - 30 мг, Carbo vegetabilis D6 - 60 мг, Pulsatilla pratensis D4 - 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 - 60 мг, Strychnos nux-vomica D4 - 60 мг

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки с фаской, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиспастическое, седативное, гемостатическое, гастропротекторное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в его состав.

Показания

В комплексном лечении при остром и хроническом гастрите, изжоге, метеоризме.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны его применять.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

В случае рвоты, потери веса, необычного цвета испражнений, устойчивых, непонятных или новых жалоб следует обратиться к врачу, поскольку это могут быть признаки заболевания, что требует дополнительного лечения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена. Никаких побочных эффектов не выявлено.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременными и женщинами, которые кормят грудью, решает врач индивидуально, с учетом соотношения риска / пользы из-за недостаточности задокументированного опыта применения.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) 3 раза в сутки.

Детям до 12 лет - 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 150 мл кипяченой воды комнатной температуры. Применять разовую возрастную дозу:

- детям от 2 до 6 лет - 1/2 общего объема приготовленного раствора;
- от 6 до 12 лет - 2/3 общего объема приготовленного раствора (остатки раствора вылить).

В случае острого начала заболевания:

- взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке каждые 30-60 минут, до 12 раз в сутки до устранения симптомов;
- детям в возрасте от 6 до 12 лет - разовую дозу принимать каждые 30-60 минут, до 6 раз в сутки до устранения симптомов;
- детям от 2 до 6 лет - разовую возрастную дозу каждые 30-60 минут, до 6 раз до устранения симптомов.

После устранения острых симптомов перейти на прием разовой дозы 1-3 раза в сутки.

Лекарственное средство применять за 15-20 минут до еды или через час после.

Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Детям до 2 лет применения лекарственного средства противопоказано.

Детям в возрасте от 2 лет назначается для лечения метеоризма.

Детям до 12 лет не назначается для лечения острого и хронического гастрита, изжоги.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Закрывать контейнер с таблетками немедленно после применения, защищать от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).