

Состав

действующие вещества: 100 г капель содержат 29 г экстракта (1:11) из корня горечавки (*Radix Gentianae*) цветков первоцвета с чашечкой (*Flores Primulae cum Calycibus*) травы щавеля (*Herba Rumicis*) цветков бузины (*Flores Sambuci*) травы вербены (*Herba Verbenae*) (1:3:3:3:3), (экстрагент этанол 59% (об / об) .

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Содержание этанола - 19% (об / об).

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная или слегка мутная жидкость желто-коричневого цвета, горькая на вкус, с ароматным запахом. В процессе хранения возможно помутнение или выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Компоненты, входящие в состав растительного лекарственного средства, имеют комплексную активность, проявляющаяся в секретолитическом действии, противоотечное, противовоспалительное, иммуностимулирующее и противовирусным эффектом.

Активные компоненты препарата Синупрет подавляют размножение различных респираторных вирусов, таких как вирус гриппа А, парагриппа и РСВ (респираторно-синцитиальный вирусов).

Препарат регулирует секрецию и уменьшается отек тканей. Восстанавливается дренаж и вентиляцию околоносовых пазух, устраняет заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей. Повышается эффективность антибиотикотерапии.

Показания

Острые и хронические воспаления придаточных пазух носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любой из действующих или вспомогательных веществ препарата, к другим видам первоцвета, а также язва.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.

Особенности применения

Особого внимания требует прием препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый «чувствительный желудок»). Препарат следует применять после еды.

Лекарственное средство содержит этанол 19% (об / об), поэтому его не следует применять пациентам, страдающим алкоголизмом или успешно завершили лечение от алкоголизма.

Также при приеме доз, превышающих рекомендуемые, есть риск для здоровья детей и пациентов с заболеваниями печени, эпилепсией, органическими заболеваниями головного мозга.

Во время хранения препарата возможно его помутнение или выпадение осадка, однако это не влияет на действие препарата. Перед употреблением взбалтывать.

Если симптомы заболевания не исчезают или периодически повторяются после 7-14 дней лечения, следует обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или другими механизмами, но следует иметь в виду, что препарат содержит этанол.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат можно применять после консультации с врачом в случае, если польза от применения превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другое, препарат применять в следующих дозах:

Возраст	Разовая доза	Суточная доза
Дети в возрасте от 2 до 5 лет	по 15 капель, что эквивалентно 0,9 мл	45 капель (3 раза по 15 капель), что эквивалентно 2,7 мл
Дети в возрасте от 6 до 11 лет	по 25 капель, что эквивалентно 1,5 мл	75 капель (3 раза по 25 капель), что эквивалентно 4,5 мл
Дети от 12 лет и взрослые	по 50 капель, что эквивалентно 3 мл	150 капель (3 раза по 50 капель), что эквивалентно 9 мл

Взрослые принимают капли, как правило, в неразбавленном виде или при желании с необходимым количеством жидкости. Детям капли следует применять в разведенном виде и чтобы скрыть горький вкус, можно добавлять в сок или чай.

Обычно рекомендованный курс лечения составляет 7-14 дней, если не был назначен врачом другой.

Дети

В связи с недостаточностью опыта применения препарат не следует применять детям до 2 лет.

Передозировка

Случаи передозировки в настоящее время неизвестны. При превышении дозы возможно усиление возникновения указанных побочных реакций.

Лечение: при возникновении проявлений отравления или передозировки необходима симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Нечасто наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, включая боль в желудке, тошноту, диарею, рвоту, боль дискомфорт. Возможны реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивница, отек Квинке, одышку, припухлость лица.

При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 3 місяців.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе с дозирующим капельным устройством сверху, с навинчивающейся крышкой и кольцом контроля открытия, помещенном в картонную коробку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика СЕ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г.. Ноймаркт, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).