

Состав

действующее вещество: мать-и-мачехи листья (*Farfarae folia*).

1 пачка содержит мать-и-мачехи листья (*Farfarae folia*) 100 г.

Лекарственная форма

Листья резанно-прессованные.

Основные физико-химические свойства: кусочки цилиндрической формы, поверхность гладкая, блестящая, реже матовая, мраморная, на торцах неровная. Цвет темно-зеленый с более светлыми вкраплениями, на торцах светлее.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, смягчающее, потогонное, спазмолитическое действие; восстанавливают активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, способствуют разжижению и отхождению мокроты, вызывают обволакивающее действие на слизистую оболочку полости рта и гортани, защищая ее от раздражения.

Показания

Заболевания дыхательных путей (ларингиты, трахеиты, хронические бронхиты, бронхопневмонии, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку листьев резанно-прессованных поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой.

Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана 2-3 раза в день за 1 час до еды или по 1 столовой ложке 4-6 раз в сутки. Детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 1 час до еды. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° C не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО "Лектравы".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.