

Состав

действующее вещество: льна семена (Lini semina);

1 пачка содержит льна семена (Lini semina) 200 г.

Лекарственная форма

Семян.

Основные физико-химические свойства: семена сплюснутые, яйцевидной формы, заостренные с одного конца и округлые с другой, неравнобокие; поверхность семян гладкая, блестящая; цвет от светло-желтого до темно-коричневого.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают обволакивающее, противовоспалительное и легкое слабительное действие, покрывая тонким слоем слизистые оболочки пищеварительного тракта и предотвращая их раздражение.

Показания

В составе комплексной терапии заболеваний слизистых оболочек пищеварительного тракта (энтериты, колиты, эзофагиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительных процессов кожи (фурункулез, абсцессы).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Острый и хронический холецистит в стадии обострения; непроходимость кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку семян залить 100 мл кипятка и взбалтывать в течение 15 мин, процедить. Внутренне применять только свежеприготовленный препарат в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ¼ стакана, детям 12-14 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по 1 столовой ложке, 3-7 лет - по 1 десертной ложке.

Внешне применять сухие нагретые семена в полотняных мешочках или свижеперемеленная, запаренное в небольшом количестве кипятка в виде припарок при фурункулах и абсцессах для ускорения их созревания.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

При передозировке возможна диарея.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, при длительном применении - диарея и болевой синдром. При возникновении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.