

Состав

действующее вещество: glycerol;

1 суппозиторий содержит глицерина 0,88 г;

вспомогательные вещества: натрия карбонат декагидрат; кислота стеариновая макрогол 400.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории полупрозрачные, почти бесцветные или со слабым желтоватым оттенком, с поверхностью, мажет, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразной углубления, воздушного стержня, помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя, наличие конденсата на упаковке.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства. Код АТХ А06 АХ01.

Фармакодинамика

В чистом виде глицерин имеет раздражающее действие, исчезает при добавлении воды (до 30-50%), вазелина, ланолина. При введении в прямую кишку суппозитории оказывают легкое раздражающее действие на слизистую оболочку и рефлекторным путем стимулируют дефекацию. При применении в виде ректальных суппозитория облегчает выведение каловых масс. Эффект лекарственного средства наступает в течение 5-30 минут.

Фармакокинетика

После ректального введения всасывания слабое, пребывание в организме кратковременное. Практически не поступает в системный кровоток и не предоставляет системных побочных эффектов.

Показания

Запоры различной этиологии (когда применение пероральных препаратов невозможно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Кишечная непроходимость, почечная недостаточность, аппендицит, кровотечения, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания, опухоли прямой кишки, недиагностированный боль в животе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами.

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие других лекарств, которые применяются ректально.

Необходимо соблюдать многочасового интервала.

Особенности применения

Не рекомендуется применять суппозитории курсом лечения более 1 недели.

С осторожностью применять при нарушении функции почек, аллергии, тошноте, рвоте.

До и после применения суппозиторий следует тщательно вымыть руки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода. Неизвестно, выводится глицерин в грудное молоко, поэтому препарат врач может назначать только тогда, когда ожидаемая польза для женщины, которая кормит грудью, превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

По 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15-20 мин после завтрака. Суппозиторий вводят в прямую кишку и держат там в течение не менее 5 мин, если не

происходит опорожнение раньше. Остатки суппозиториев выводятся из организма вместе с калом. При необходимости дозу можно увеличить до 2 суппозиториев в сутки. Детям до 5 лет - 1 суппозиторий (содержащий 0,88 г глицерина) 1 раз в сутки.

Дети

Нет ограничений.

Передозировка

Частый жидкий стул. Проходит самостоятельно после отмены препарата.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции боль, тошнота, рвота, желудочно-кишечное кровотечение. При длительном применении наблюдались раздражение и неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипе, по 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЭКС ГРУПП».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08300, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, 100.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).