

Состав

действующее вещество: кремния диоксид коллоидный;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, сорбит (Е420), кроскармеллоза натрия, стеарат магния.

Показания

В качестве монотерапии или в комплексной терапии:

- острых кишечных заболеваний (сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);
- острой диареи различной этиологии;
- экзогенной интоксикации бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями
- тяжелых металлов, другими веществами) лекарственными препаратами, при алкогольно-пищевых перегрузках.

Как вспомогательная терапия:

- при вирусных гепатитах;
- при аллергических заболеваниях;
- при дерматитах;
- при позднем токсикозе беременных.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость действующего вещества, а также вспомогательных веществ. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочные и кишечные кровотечения, кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном использовании Белого Угля® и ацетилсалициловой кислоты могут усиливаться процессы дезагрегации тромбоцитов. В комплексной терапии с никотиновой кислотой и симвастатином, Белый Уголь® проявляет синергическое действие: способствует снижению уровня атерогенных фракций липидного спектра крови и повышению уровня холестерина липопротеидов высокой плотности.

Особенности применения

Белый Уголь® во время его использования в комплексной терапии необходимо принимать за 1 час до приема других пероральных лекарственных средств, чтобы предотвратить снижение их эффективности. Поскольку лекарственное средство Белый Уголь® не содержит сахара, его можно применять пациентам с сахарным диабетом. Лекарственное средство содержит сорбит, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Решение о приеме лекарственного средства Белый Уголь® в период беременности и кормления грудью принимает врач, учитывая соотношение польза/риск.

Способ применения и дозы

Принимать в промежутках между приемами пищи, запивая питьевой водой:

- взрослым и детям старше 7 лет - по 3-5 таблеток 3-4 раза в сутки;
- детям 5-6 лет - по 3 таблетки 3 раза в сутки;
- детям в возрасте 3-4 лет - по 2 таблетки 3 раза в сутки;
- детям до 3-х лет препарат не назначают.

При крайней необходимости в тяжелых случаях разовую дозу можно увеличить до 10-14 таблеток. При острых кишечных заболеваниях курс лечения составляет 3-5 дней. В тяжелых случаях срок лечения может быть продлен до 10-15 дней. Курс лечения вирусных гепатитов зависит от тяжести заболевания и составляет 10-14 дней. Продолжительность лечения зависит от протекания болезни.

Передозировка

О случаях передозировки сообщений не было.

Побочные реакции

Случаев побочных реакций при соблюдении способа применения зафиксировано не было. При превышении рекомендуемых доз возможны единичные случаи запоров.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08301, Киевская обл., Г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).