

Состав

действующее вещество: hederæ helicis folium;

1 мл сиропа содержит 7 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (Extr. Hederae helicis e folium spir. Sicc. ((4-8): 1), (экстрагент: этанол 30%);

вспомогательные вещества: калия сорбат; лимонная кислота моногидрат сорбитол жидкий, не кристаллизуется; ксантановая камедь; вода очищенная

1 мл сиропа содержит 550 мг Сахарозамен вещества сорбита, что соответствует 0,04 хлебной единицы.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: светло-коричневая, слегка мутная, вязкая жидкость со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A12.

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, обуславливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Снижает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Хронические воспалительные заболевания бронхов - симптоматическое лечение.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу, растений семейства аралиевых, или к любому другому компоненту препарата. Непереносимость фруктозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Без консультации врача не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, например с кодеином или декстрометорфаном.

При одновременном применении других лекарственных средств побочного действия сиропа Ритоссе® Плющ не наблюдалось. Поэтому этот препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например с антибиотиками.

Особенности применения

Дети до 2 лет должны принимать Ритоссе® Плющ, сироп, только под наблюдением врача в условиях стационара.

Длительный или рецидивирующий кашель у детей до 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением. Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, лихорадка, а также гнойное или кровавое мокроты при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, например с кодеином или декстрометорфаном, без консультации с врачом.

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Важная информация о вспомогательные вещества.

Это лекарственное средство содержит соединения калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с нарушением функции почек или тем, кто придерживается низкокалийевой диеты.

Сироп Ритоссе® Плющ содержит сорбит. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем

принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия данных исследований этот препарат не следует принимать в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Ритоссе® Плющ, сироп, применять внутрь, отмеряя дозу с помощью мерной ложки, которая прилагается. Детям в возрасте от 1 до 6 лет - по 2,5 мл 2 раза в сутки, детям от 6 до 12 лет - по 5 мл 2 раза в сутки, взрослым и детям старше 12 лет - по 5 мл 3 раза в сутки (утром, днем и вечером).

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. В несложных случаях продолжительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжать терапию еще 2-3 суток после улучшения состояния пациента.

Перед каждым применением необходимо тщательно взбалтывать сироп!

Если улучшения состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Дети

Ритоссе® Плющ, сироп, применяют детям в возрасте от 1 года. Детям до 2 лет применяют препарат под наблюдением врача в условиях стационара.

Передозировка

Применение доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или тревожное возбуждение. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Очень редко (менее 1 случая на 10000) может проявляться слабительный эффект (в связи с содержанием сорбита), а также аллергические реакции: одышка, отек слизистых оболочек, кожная сыпь, крапивница, зуд.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

Сообщение о подозреваемых побочных реакции

Сообщение о подозреваемых побочных реакции после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза / риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемые побочные реакции через национальную систему сообщений.

Срок годности

1,5 года.

После вскрытия флакона препарат можно применять в течение 3 месяцев.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

В процессе хранения возможно легкое помутнение и незначительное изменение привкуса сиропа, не влияет на терапевтические свойства препарата.

Упаковка

По 100 мл во флаконе, по 1 флакону с мерной ложкой в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).