

Состав

действующее вещество: подорожника большого листа (Plantaginis majoris folia)

1 пачка содержит подорожника большого листа (Plantaginis majoris folia) 50 г

1 фильтр-пакет содержит подорожника большого листа (Plantaginis majoris folia) 1,5 г.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев различной формы зеленого, коричнево-зеленого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обезболивающее, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, бактериостатическое действие; усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют выделению и эвакуации слизи из них, уменьшают кашель, усиливают секрецию желудочного сока, повышают кислотность; способствуют очищению раневых и язвенных поверхностей от гноеродных бактерий, усиливают процессы грануляции поверхностей пораженных тканей.

Показания

Заболевания дыхательных путей (бронхиты, коклюш, пневмосклероз, туберкулез легких), желудочно-кишечные заболевания (гастриты и язвенная болезнь желудка с пониженной кислотностью, энтериты и энтероколиты) - в составе комплексной терапии. Внешне применять как ранозаживляющее средство.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Гиперацидный гастрит, язва двенадцатиперстной кишки и язвенная болезнь

желудка с повышенной кислотностью; повышенная свертываемость крови и склонность к тромбообразованию, рефлюкс-эзофагит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по $\frac{1}{3}$ стакана 3 раза в день за 10-15 мин до еды детям в возрасте 1-3 лет - по 1 чайной ложке, 2-5 лет - по 1 десертной ложке, 5-10 лет - по 1 столовой ложке, 10-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана 3 раза в день за 10-15 мин до еды.

3 фильтр-пакеты поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым принимать в теплом виде по $\frac{1}{2}$ стакана 4 раза в день за 10-15 мин до еды детям 1-3 лет - по 1 десертной ложке, 3-5 лет - по 2 десертные ложки, 5-10 лет - по 2 столовые ложки, 10-14 лет - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день за 10-15 мин до еды.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Внешне - смачивать настоем марлевую салфетку и прикладывать на пораженные участки кожи.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), изжога.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.