

Состав

водно-спиртовые экстракты листовика сколопендрового, побегов багульника, травы горца птичьего (спорыша), душицы, фиалки, корня солодки.

Лекарственная форма

Водно-спиртовой раствор. Помутнение раствора или появление осадка не свидетельствует о порче или потере активности препарата.

Фармакодинамика

Клинически подтверждено, что при применении фитоконцентрата Бронхин исчезает необходимость в использовании других бронхолитическим и муколитических препаратов. Он является эффективным комплексным противовоспалительным, бронхолитическим, муколитическим средством. Фитоконцентрат усиливает физиологическую активность мерцательного эпителия и моторную функцию бронхиол, способствует продвижению мокроты из нижних отделов дыхательных путей в верхние и выведению ее наружу. Это действие сочетается с усилением секреции бронхиальных желез и уменьшением вязкости мокроты.

Широкий спектр положительных изменений в бронхолегочной системе при применении Бронхина подтверждается ростом восьми показателей функции внешнего дыхания при хронических бронхитах (в частности обструктивных), бронхопневмонии затяжной характер, бронхиальной астме. Применение препарата при бронхиальной астме помогает уменьшить дозу гормональных препаратов и муколитиков, облегчить ее течение, а в комплексе с фитоконцентратом Лизорм позволяет часто полностью избавиться от этого заболевания.

Показания

Фитоконцентрат Бронхин - функциональный продукт натурального происхождения, эффективное средство против кашля любой природы. Применяется при:

- острых и хронических заболеваниях органов дыхания;
- бронхите;
- пневмонии,

- кашлевом синдроме;
- бронхиальной астме;
- туберкулезе легких,
- бронхоэктатической болезни;
- профессиональных заболеваниях легких.

Противопоказания

Беременные женщины, кормящие матери, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особенности применения

Улучшает бронхиальную проходимость, является комплексным противовоспалительным, бронхолитическим, муколитическим средством. При использовании Бронхина исчезает необходимость в применении других бронхолитических и муколитических средств.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Способ применения и дозировка: взрослым в целях профилактики по 30 - 50 капель на 100 мл за 30 минут до или после еды один-два раза в день. Курс- 3 недели. Повторный курс - после двухнедельного перерыва.

Дозировка для детей: 1 капля препарата на 1 кг веса ребенка равно суточной дозе, которую делят на 2 приема и разводят теплой водой из расчета каждые 5 капель на столовую ложку воды.

Побочные реакции

Фитоконцентрат Бронхин хорошо переносится и не имеет побочных действий.

Побочных эффектов при апробации Бронхина в клиниках разного профиля не было (на упаковке указаны общие ограничения).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в темном недоступном для детей месте при температуре от 15 ° С до 25 ° С.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЭКОМЕД ООО

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, Харьковская область, Харьков, 57001, ул. Бакулина, 4