

Состав

1 таблетка содержит высушенные лекарственные растения в виде порошка:

травы щавеля (*Herba Rumicis*) 36 мг;

травы вербены (*Herba Verbenae*) 36 мг;

корня горечавки (*Radix Gentianae*) 12 мг;

цветков бузины (*Flores Sambushi*) 36 мг;

цветков первоцвета с чашечкой (*Flores Primulae cum Calycibus*) 36 мг;

вспомогательные вещества: акрилатный сополимер, алюминия гидроксид, воск монтановый гликолевой, вода очищенная, глюкозы раствор, декстрин, желатин, индигокармин (E 132), кислота стеариновая, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция карбонат (E 17 лактозы моногидрат, магния оксид легкий, меди хлорофиллин (E 141), масло касторовое рафинированное, рибофлавин (E 101), сахароза, сорбит (E 420), тальк, титана диоксид (E 171), шеллак.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета, покрытые оболочкой, с гладкой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакологические свойства

Растительные компоненты, входящие в состав лекарственного средства, обладают комплексной активностью, проявляющейся в секретолитическом действии, противовоспалительном и противоотечном эффектах.

Под действием препарата регулируется секреция и уменьшается отек тканей. Восстанавливается дренаж и вентиляция околоносовых пазух, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей.

Показания

Острые и хронические воспаления приносовых пазух носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из действующих или других компонентов препарата, другим видам первоцвета, а также пептическая язва.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время отсутствуют сведения о каких-либо взаимодействиях препарата Синупрет® форте с другими лекарственными средствами.

При одновременном применении других лекарственных средств следует обратиться за консультацией к врачу.

Особенности применения

Если у пациента возникает кровотечение из носа, стойкая лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носа или симптомы заболевания продолжают длиться более 7-14 дней или ухудшаются или повторяются, следует обратиться к врачу.

Если известно о наличии гастрита или функциональных расстройств желудка (так называемый «чувствительный желудок»), требуется особая осторожность при приеме этого лекарственного средства. Синупрет форте следует принимать преимущественно после еды с достаточным количеством жидкости (например, стаканом воды).

Из-за содержания глюкозы, лактозы, сахарозы и сорбита лекарственное средство не следует принимать больным с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, лактазной недостаточностью с нарушением всасывания глюкозы-галактозы (мальабсорбцией) или недостаточностью сахаразы-изомальтазы. Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Примечание для больных диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,03 хлебной единицы (ХО).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности или кормления грудью лекарственное средство Синупрет® форте можно применять только после четкого установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы матери/риска для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям от 12 лет применять по 1 таблетке 3 раза в сутки. Таблетки следует принимать не разжевывая с достаточным количеством жидкости. Пациентам с гастритом или функциональным расстройством желудка (так называемый «чувствительный желудок») следует принимать препарат после еды.

Если врач не назначил иначе, рекомендуемый курс лечения составляет 7-14 дней. Следуйте инструкциям «Особенности применения».

Дети

Не применять детям до 12 лет из-за недостаточности исследований.

Передозировка

Случаи передозировки на данный момент неизвестны. Возможно усиленное возникновение указанных побочных реакций – в таком случае следует обратиться к врачу.

Лечение: симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Редко наблюдаются желудочно-кишечные нарушения (например, боль в желудке, тошнота, диарея, рвота, абдоминальный дискомфорт). В единичных случаях возникают реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивницу, отек Квинке, одышку, припухлость лица.

При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

При появлении гиперчувствительности/аллергической реакции таблетки, покрытые оболочкой, Синупрет® форте не следует принимать снова.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок годности включает в себя последний день указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика SE/Bionorica SE.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г. Ноймаркт,
Германия/Kerschensteinerstrasse, 11-15, 92318 Neumarkt, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).